

# Standard de la fanne européenne

## **Ont participé à l'élaboration de ce standard :**

**Jacques Faivre, François Vuillaume, Enrique Gomez, Lionel Durochat, Jean-Michel Eytorff, David Vettese, Jean-Luc Berbudeau.**

**Documentations : UOF, FOI, FOA, KBOF**

**Photographies : P. Rocher, E. Gomez, S. Chartier, R. Driesmans, J.-M. Eytorff, J-L Berbudeau, B. Comelieu, A Cupido, Cazadilla, Mingeroet, P. Malburet, J.-P. Hennebique, Rafael Rios Arena. L. Durochat, R. Rojas, A. Van**

**Merci aux auteurs de nous avoir permis la publication de leurs photos**

**Un merci tout particulier à Hermann Heinzl pour ses illustrations**

**Terminé le 26 mai 2014.**

**Modifié partiellement par la CNJF en Aout 2022. Version 1.10.**

**La reproduction et l'utilisation de ces documents sont interdites sans l'autorisation de leurs auteurs ainsi que de la COM/OMJ.**

# Passereaux

Ils font partie des Passériformes. Il s'agit d'oiseaux, généralement petits sauf les corbeaux (Corvidae).

## 1. Généralité et jugement

2. **Motacillidae** : plumage comportant des tons gris, blancs noirs jaunes. Hochent la queue de haut en bas presque continuellement. Marchent à petits pas rapides.

- **Bergeronnettes**
  - Bergeronnette grise (*Motacilla alba*)
  - Bergeronnette des ruisseaux (*Motacilla cinerea*)
  - Bergeronnette printanière (*Motacilla flava*)

3. **Bombycillidae** : bec assez court et épais.

- **Jaseurs**
  - Jaseur boréal (*Bombycilla garrulus*)

4. **Prunellidae** : petits oiseaux terrestres ressemblant à des moineaux mais différant par ; un bec fin d'insectivore et flancs striés. Sautillent ou marche comme s'ils se traînaient, entrouvrant souvent les ailes.

- **Accenteur**
  - Accenteur mouchet (*Prunella modularis*)
  - Accenteur alpin (*Prunella collaris*)

5. **Turdidae** : vaste famille réunissant plusieurs des meilleurs chanteurs européens. Tous sont insectivores et frugivores. Ils courent ou sautillent.

- **Rossignol**
  - Rossignol philomèle (*Lusciama megarymchos*)
  - Rossignol progré (*Lusciana lusciانا*)
- **Rouge gorge**
  - Rouge-gorge (*Erythacus rubecula*)
- **Calliope**
  - Calliope sibérienne (*Lusciانا calliope*)
  - Gorge-bleue à miroir (*Lusciانا svecica*)
- **Tariers**
  - Tarié pâtre (*saxicola torquata*)
  - Tarié des prés (*saxicola rubetra*)
- **Rouge queue**
  - Rouge queue noir (*Phoenicurus ochurus*)
  - Rouge queue à front blanc (*Phoenicurus phoenicurus*)
- **Monticules**

- Merle bleu (*Monticola solitarius*)
  - Merle de roche (*Monticola saxatilis*)
  - **Merles**
    - Merle noir (*Turdus merula*)
    - Merle à plastron (*Turdus torquatus alpestris*)
  - **Grives**
    - Grive litorne (*Turdus pilaris*)
    - Grive mauvis (*Turdus iliacus*)
    - Grive musicienne (*Turdus philomelos*)
    - Grive draine (*Turdus viscivorus*)
- 6. Sylviidae :** petits passereaux insectivores. Sexes généralement semblables, juvéniles comme adultes.
- **Fauvettes**
    - Fauvette des jardins (*Sylvia borin*)
    - Fauvette grisette (*Sylvia communis*)
    - Fauvette à tête noire (*Sylvia atricapilla*)
- 7. Panurinae (Timaliidae) :** ressemblent superficiellement aux « mésanges » à longue queue.
- **Panure à moustaches**
    - Panure à moustaches (*Panurus biarmicus*)
- 8. Aegithalidae :** petit oiseau au bec très court, longue queue étagée correspondant à plus de la moitié de la longueur totale.
- **Mésange à longue queue**
    - Mésange à longue queue (*Aegithalos caudatus*)
- 9. Remizidae :** allure de mésange, mais bec un peu plus long et fin. Oiseau actif et acrobate.
- **Mésange rémiz**
    - Mésange rémiz (*Remiz pendulinus*)
- 10. Paridae :** petits oiseaux insectivores remuants, acrobates. Sexes semblables.
- **Mésanges**
    - Mésange huppée (*Parus cristatus*)
    - Mésange nonnette (*Parus palustris*)
    - Mésange boréale (*Parus montanus*)
    - Mésange noire (*Parus ater*)
    - Mésange charbonnière (*Parus major*)
    - Mésange azurée (*Parus cyanus*)
    - Mésange bleue (*Parus caeruleus*)
- 11. Sittidae :** passereau trapu, queue courte, sexes généralement semblables. Très actives, les meilleurs oiseaux grimpeurs, se déplacent dans tous les sens sur les arbres. Se nourrissent d'invertébrés, graines, fruits secs et coincent les plus durs dans une fente pour les ouvrir à coup de bec.
- **Sittelle**

- Sittelle torchepot (*Sitta europea*)

**12. Corvidae :** grands passereaux souvent grégaires. Comportement très évolué. Ne chantent pas. Bec souvent robuste. Sexes semblable.

- **Geai**
  - Geai des chênes (*Garrulus glandarius*)
- **Pies**
  - Pie bavarde (*Pica pica*)
  - Pie bleu (*Cyanopica cyanus*)
- **Corbeaux**
  - Corbeau freux (*Corvus frugilegus*)
  - Corneille noire (*Corvus corone corone*)
  - Corneille mantelée (*Corvus corone cornix*)
  - Choucas des tours (*Corvus monedula*)
  - Grand corbeau (*Corvus corax*)

**13. Sturnidae :** passereaux grégaires de taille moyenne. Plumage souvent noirâtre et irisé. Pattes plus ou moins courtes, bec robuste. Sexes semblables. Marchent à petits pas et courent.

- **Etourneaux**
  - Etourneau sansonnet (*Sturnus vulgaris*)
- **Martins**
  - Martin roselin (*Sturnus roseus*)

**14. Passeridae :** plumage dépourvu de couleurs vives. Bec court, épais queue peu ou pas échancrée.

- **Niverolle**
  - Niverolle (*Montifringilla nivalis*)
- **Moineaux**
  - Moineau soulcy (*Petronia petronia*)
  - Moineau espagnol (*Passer hispaniolensis*)
  - Moineau cisalpin (*Passer italiae*)
  - Moineau domestique (*Passer domesticus*)
  - Moineau friquet (*Passer montanus*)

**15. Fringillidae :** petits passereaux plus ou moins grégaires après la reproduction. Bec robuste de granivore. Chant souvent plus mélodieux que celui des bruants.

- **Pinsons**
  - Pinson du nord (*Fringilla montifringilla*)
  - Pinson des arbres (*Fringilla coelebs*)
- **Venturons**
  - Venturon montagnard (*Serinus cintrinella*)
  - Venturon montagnard corse (*Serinus cintrinella corsica*)
- **Serins**
  - Serin cini (*Serinus serinus*)
- **Sizerins**
  - Sizerin flammé (*Carduelis flammea flammea*)

- ◆ Sizerin cabaret (*Carduelis flammea cabaret*)
  - Sizerin blanchâtre (*Carduelis hornemanni*)
- **Linottes**
  - Linotte à bec jaune (*Carduelis flavirostris*)
  - Linotte mélodieuse (*Carduelis cannabina*)
- **Tarin**
  - Tarin des aulnes (*Carduelis spinus*)
- **Chardonnerets**
  - Chardonneret élégant (*Carduelis carduelis*)
    - ◆ Chardonneret major
    - ◆ Chardonneret ibérique (*Carduelis c. parva*)
- **Verdier**
  - Verdier d'Europe (*Carduelis chloris chloris*)
    - ◆ Verdier d'Europe (*Carduelis chloris aurantiventris*)
- **Bouvreuils**
  - Bouvreuil pivoine (ponceau) (*Pyrrhula pyrrhula pyrrhula*)
    - ◆ Bouvreuil pivoine (*Pyrrhula pyrrhula europea*)
    - ◆ Bouvreuil pivoine ibérique (*Pyrrhula pyrrhula iberiae*)
- **Gros bec**
  - Gros bec casse-noyaux (*Coccothraustes coccothraustes*)
- **Roselins**
  - Roselin githagine (*Rhodopechys githaginea*)
  - Roselin cramoisi (*Carpodacus erythrinus*)
- **Dur-bec**
  - Durbec des sapins (*Pinicola enucleator*)
- **Becs-croisés**
  - Bec croisé des sapins (*Loxia curvirostra*)
  - Bec croisé bifascié (*Loxia leucoptera*)
  - Bec croisé perroquet (*Loxia pytyopsittacus*)

**16. Emberizidae :** la majorité diffèrent de la plupart des fringilles et moineaux par ; tête plus petite, bec conique, queue plus longue et peu fourchue. Chant plutôt médiocre.

- **Bruant**
  - Bruant proyer (*Emberiza calandra*)
  - Bruant fou (*Emberiza cia*)
  - Bruant jaune (*Emberiza citrinella*)
  - Bruant zizi (*Emberiza cirrus*)
  - Bruant à tête rousse (*Emberiza bruniceps*)
  - Bruant mélanocéphale (*Emberiza melanocephala*)
  - Bruant ortolan (*Emberiza hortulanus*)
  - Bruant des roseaux (*Emberiza schoeniclus*)

**17. Mutations de la faune européenne homologuées par la COM/OMJ**

## Table des matières

Dessin.....	13
Couleurs.....	14
Forme & grandeur.....	15
PLUMAGE.....	16
Maintien, conditions & impression.....	17
FICHE DE JUGEMENT.....	18
Bergeronnette grise ( <i>Motacilla alba</i> ).....	20
Bergeronnette des ruisseaux ( <i>Motacilla cinerea</i> ).....	23
Bergeronnette printanière ( <i>Motacilla flava</i> ).....	25
Jaseur boréal ( <i>Bombycilla garrulus</i> ).....	27
Accenteur mouchet ( <i>Prunella modularis</i> ).....	30
Accenteur alpin ( <i>Prunella collaris</i> ).....	33
Rossignol philomèle ( <i>Lusciama megarhynchos</i> ).....	34
Rossignol progré ( <i>Lusciama lusciama</i> ).....	36
Rouge gorge ( <i>Erithacus rubecula</i> ).....	37
Calliope sibérienne ( <i>Lusciama calliope</i> ).....	40
George bleu à miroir ( <i>Lusciama svecica</i> ).....	41
Tarier pâtre ( <i>saxicola torquata</i> ) mâle.....	44
Tarier pâtre ( <i>saxicola torquata</i> ) femelle.....	46
Tarier des prés ( <i>saxicola rubetra</i> ).....	48
Rouge queue noir ( <i>Phoenicurus ochurus</i> ).....	49
Rouge queue à front blanc ( <i>Phoenicurus phoenicurus</i> ).....	52
Merle bleu ( <i>Monticola solitarius</i> ).....	54
Merle de roche ( <i>Monticola saxatilis</i> ).....	55
Merle noir mâle ( <i>Turdus merula</i> ).....	56
Merle noir femelle ( <i>Turdus merula</i> ).....	57
Merle noir mâle~ Mutation pastel ~.....	58
Merle noir femelle~ Mutation pastel ~.....	59
Merle noir~ Mutation ino (ex-albino)~.....	60
Merle noir~ Mutation blanc ~.....	61
Merle à plastron ( <i>Turdus torquatus alpestris</i> ).....	62
Grive musicienne ( <i>Turdus philomelos</i> ).....	64
Grive musicienne~ Mutation brun ~.....	66
Grive musicienne~ Mutation blanche ~.....	68
Grive musicienne~ Mutation satiné.....	69

Grive draine ( <i>Turdus viscivorus</i> ) .....	70
Grive mauvis ( <i>Turdus iliacus</i> ) .....	72
Grive litorne ( <i>Turdus pilaris</i> ) .....	74
Fauvette à tête noire ( <i>Sylvia atricapilla</i> ) .....	76
Fauvette des jardins ( <i>Sylvia borin</i> ) .....	78
Fauvette grisette ( <i>Sylvis communis</i> ).....	80
Panure à moustache ( <i>Panurus biarmicus</i> ).....	82
Mésange à longue queue ( <i>aegithalos caudatus</i> ).....	86
Mésange Rémiz ( <i>Remiz pendulinus</i> ).....	88
Mésange huppée ( <i>Parus cristatus</i> ) .....	90
Mésange nonnette ( <i>Parus palustris</i> ) .....	92
Mésange boréale ( <i>Parus montanus</i> ).....	93
Mésange noire ( <i>Parus ater</i> ).....	94
Mésange charbonnière ( <i>Parus major</i> ) .....	96
Mésange azurée ( <i>Parus cyanus</i> ) .....	98
Mésange bleue ( <i>Parus caeruleus</i> ).....	99
Sittelle torchepot ( <i>Sitta europea</i> ).....	101
Geai des chênes ( <i>Garrulus glandarius</i> ) .....	104
Geai des chênes .....	105
~ Mutation opale ~ .....	105
Pie bavarde ( <i>Pica pica</i> ) .....	106
Pie bavarde .....	108
~ Mutation brune ~ .....	108
Pie bleue ( <i>Cyanopica cyanus</i> ).....	109
Corbeau freux ( <i>Corvus frugilegus</i> ) .....	111
Corneille noire ( <i>Corvus corone corone</i> ).....	113
Corneille mantelée ( <i>Corvus corone cornix</i> ).....	115
Choucas des tours ( <i>Corvus monedula</i> ) .....	116
Grand corbeau ( <i>Corvus corax</i> ) .....	118
Etourneau sansonnet ( <i>Sturnus vulgaris</i> ) .....	120
~ Mutation brun ~ .....	122
~ Mutation agate ~ .....	123
~ Mutation phaèò ~ .....	124
~ Mutation blanc ~ .....	125
~ Mutation pastel ~ .....	126
Martin roselin ( <i>Sturnus roseus</i> ) .....	127

Niverolle ( <i>Montifringilla nivalis</i> ) .....	128
Moineau soulcie ( <i>Petronia petronia</i> ).....	130
Moineau espagnol ( <i>Passer hispaniolensis</i> ) .....	131
Moineau cisalpin ( <i>Passer italiae</i> ) .....	133
Moineau domestique mâle ( <i>Passer domesticus</i> ) .....	134
Moineau domestique femelle ( <i>Passer domesticus</i> ).....	136
Moineau domestique mâle~ Mutation brun ~ .....	137
Moineau domestique femelle~ Mutation brun ~ .....	139
Moineau domestique mâle~ Mutation « phaéo»~ .....	140
Moineau domestique femelle~ Mutation « phaéo»~ .....	141
Moineau domestique mâle~ Mutation agate ~ .....	142
Moineau domestique femelle~ Mutation agate ~ .....	143
Moineau domestique mâle~ Mutation opale ~ .....	144
Moineau domestique femelle~ Mutation opale ~ .....	145
Moineau domestique mâle~ Mutation brun pastel ~ .....	146
Moineau domestique femelle~ Mutation brun pastel ~ .....	147
Moineau domestique~ Mutation ino (ex-albino) ~ .....	148
Moineau domestique~ Mutation blanc ~ .....	149
Moineau domestique~ Mutation mâle satiné ~ .....	150
Moineau domestique~ Mutation femelle satiné ~ .....	151
Moineau friquet ( <i>Passer montanus</i> ).....	152
~ Mutation opale ~ .....	153
~ Mutation brun ~ .....	154
~ Mutation brun opale ~ .....	155
Pinson des arbres mâle ( <i>Fringilla coelebs</i> ) .....	157
Pinson des arbres femelle ( <i>Fringilla coelebs</i> ).....	158
Pinson des arbres mâle~ Mutation brun ~ .....	159
Pinson des arbres femelle~ Mutation brun ~ .....	160
Pinson des arbres mâle~ Mutation agate ~ .....	161
Pinson des arbres femelle~ Mutation agate ~ .....	162
Pinson des arbres mâle~ Mutation opale ~ .....	163
Pinson des arbres femelle~ Mutation opale ~ .....	164
Pinson des arbres~ Mutation brun opale ~ .....	165
Pinson du nord mâle ( <i>Fringilla montifringilla</i> ) .....	167
Pinson du nord femelle ( <i>Fringilla montifringilla</i> ) .....	168
Venturon montanard mâle ( <i>Serinus cintrinella</i> ) .....	171

Venturon montagnard femelle ( <i>Serinus cintrinella</i> ) .....	172
Venturon montagnard corse ( <i>Serinus cintrinella corsica</i> ) .....	173
Serin cini mâle ( <i>Serinus serinus</i> ) .....	175
Serin cini femelle ( <i>Serinus serinus</i> ) .....	176
Sizerin cabaret ( <i>Acanthis flammea cabaret</i> ) .....	178
Sizerin flammé ( <i>Acanthis flammea flammea</i> ) .....	180
Sizerin .....	181
~ Mutation brune ~ .....	181
~ Mutation Pastel (ex-agate) ~ .....	182
~ Mutation brun pastel (ex-isabelle) ~ .....	183
~ Mutation écaillée (ex- pastel) .....	184
~ Mutation brun écaillé (ex-brun pastel) ~ .....	185
~ Mutation facteur foncé ~ .....	186
~ Mutation pastel facteur foncé (ex-agate foncé) ~ .....	187
~ Mutation brun facteur foncé ~ .....	188
~ Mutation phaéo ~ .....	189
Sizerin blanchâtre ( <i>Acanthis hornemanni</i> ) .....	190
Linotte mélodieuse mâle ( <i>Linaria cannabina</i> ) .....	193
Linotte mélodieuse femelle ( <i>Linaria cannabina</i> ) .....	194
Linotte à bec jaune ( <i>Linaria flavirostis</i> ) .....	196
Tarin des aulnes mâle ( <i>Spinus spinus</i> ) .....	198
Tarin des aulnes femelle ( <i>Spinus spinus</i> ) .....	199
Tarin des aulnes mâle~ Mutation brune ~ .....	200
Tarin des aulnes femelle~ Mutation brune ~ .....	201
Tarin des aulnes mâle~ Mutation brune diluée ~ .....	202
Tarin des aulnes femelle~ Mutation brune diluée ~ .....	203
Tarin des aulnes mâle~ Mutation brune double diluée ~ .....	204
Tarin des aulnes femelle~ Mutation brune double diluée ~ .....	205
Tarin des aulnes mâle~ Mutation diluée ~ .....	206
Tarin des aulnes femelle~ Mutation diluée ~ .....	207
Tarin des aulnes mâle~ Mutation double diluée ~ .....	208
Tarin des aulnes femelle~ Mutation double diluée ~ .....	209
Tarin des aulnes mâle~ Mutation pastel ~ .....	210
Tarin des aulnes femelle~ Mutation pastel ~ .....	211
Tarin des aulnes mâle~ Mutation pastel dilué ~ .....	212
Tarin des aulnes femelle~ Mutation pastel dilué ~ .....	213

Tarin des aulnes mâle ~ Mutation brune pastel.~	214
Tarin des aulnes femelle ~ Mutation brune pastel.~	216
Tarin des aulnes mâle ~ Mutation brune pastel dilué.~	217
Tarin des aulnes femelle ~ Mutation brune pastel dilué.~	218
Tarin des aulnes mâle ~ Mutation ivoire ~	219
Tarin des aulnes femelle ~ Mutation ivoire ~	220
Tarin des aulnes mâle ~ Mutation pastel ivoire ~	221
Tarin des aulnes femelle ~ Mutation pastel ivoire ~	222
Chardonneret élégant (Carduelis carduelis)	228
~ Mutation brun ~	229
~ Mutation agate ~	230
~ Mutation pastel ~	231
~ Mutation isabelle ~	232
~ Mutation satiné ~	233
~ Mutation blanc avec masque orange ~	234
~ Mutation tête blanche ~	235
~ Mutation jaune ~	236
~ Mutation aminet ~ (ex Eumo)	237
Verdier d'Europe mâle (Chloris chloris chloris)	241
Verdier d'Europe femelle (Chloris chloris chloris)	242
Verdier d'Europe mâle ~ Mutation isabelle~	243
Verdier d'Europe femelle ~ Mutation isabelle ~	244
Verdier d'Europe mâle ~ Mutation agate ~	245
Verdier d'Europe femelle ~ Mutation agate ~	246
Verdier d'Europe mâle ~ Mutation brun ~	247
Verdier d'Europe femelle ~ Mutation brun ~	248
Verdier d'Europe mâle ~ Mutation satiné ~	249
Verdier d'Europe femelle ~ Mutation satiné ~	250
Verdier d'Europe mâle ~ Mutation lutino ~	251
Verdier d'Europe femelle ~ Mutation lutino ~	252
Verdier d'Europe ~ Mutation pastel ~	253
Verdier d'Europe mâle ~ Mutation agate pastel (dénomination provisoire en étude)~	253
Verdier d'Europe femelle ~ Mutation agate pastel (dénomination provisoire en étude) ~	254
Verdier d'Europe ~ Mutation isabelle pastel (dénomination provisoire en étude) ~	256
Verdier d'Europe ~ Mutation brun pastel (dénomination provisoire en étude) ~	257
Verdier d'Europe mâle Phénotype ancestral Bec Jaune	257
Verdier d'Europe mâle Mutation Isabelle Bec Jaune	257
Verdier d'Europe femelle Mutation Isabelle Bec Jaune	257
Verdier d'Europe mâle Mutation Agate Bec Jaune	257
Verdier d'Europe femelle Mutation Agate Bec Jaune	257
Verdier Maltais	257

Bouvreuil pivoine ( <i>Pyrrhula pyrrhula</i> ) .....	262
Bouvreuil pivoine .....	264
Bouvreuil pivoine ~ Mutation pastel ~ .....	264
Bouvreuil pivoine mâle ~ Mutation brun ~ .....	266
Bouvreuil pivoine femelle~ Mutation brun ~ .....	268
Bouvreuil pivoine mâle~ Mutation brun pastel ~ .....	269
Bouvreuil pivoine femelle~ Mutation brun pastel ~ .....	270
Bouvreuil pivoine~ Mutation blanc ~ .....	271
Bouvreuil pivoine ~ Mutation jaune ~ .....	272
Bouvreuil pivoine~ Mutation brun pastel jaune ~ .....	272
Bouvreuil pivoine mâle~ Mutation topaze ~ .....	274
Bouvreuil pivoine femelle~ Mutation topaze ~ .....	275
Gros bec casse-noyaux mâle ( <i>Coccothraustes coccothraustes</i> ).....	277
Gros bec casse-noyaux femelle ( <i>Coccothraustes coccothraustes</i> ) .....	279
Roselin githagine ( <i>Rhodopechys githaginea</i> ) .....	281
Roselin cramoisi mâle ( <i>Carpodacus erythrinus</i> ).....	283
Roselin cramoisi femelle ( <i>Carpodacus erythrinus</i> ) .....	285
Durbec des sapins mâle ( <i>Pinicola enucleator</i> ) .....	289
Durbec des sapins femelle ( <i>Pinicola enucleator</i> ) .....	291
Bec croisé des sapins mâle ( <i>Loxia curvirostra</i> ).....	293
Bec croisé des sapins femelle ( <i>Loxia curvirostra</i> ).....	295
Bec croisé bifascié mâle ( <i>Loxia leucoptera</i> ) .....	297
Bec croisé bifascié femelle ( <i>Loxia leucoptera</i> ) .....	299
Bec croisé perroquet mâle ( <i>Loxia pytyopsittacus</i> ).....	301
Bec croisé perroquet femelle ( <i>Loxia pytyopsittacus</i> ) .....	303
Bruant fou ( <i>Emberiza cia</i> ).....	304
Bruant mélanocéphale ( <i>Emberiza melanocephala</i> ) .....	306
Bruant ortolan ( <i>Emberiza hortulanus</i> ) .....	308
Bruant zizi ( <i>Emberiza cirlus</i> ).....	310
Bruant à tête rousse ( <i>Emberiza bruniceps</i> ) mâle .....	312
Bruant à tête rousse ( <i>Emberiza bruniceps</i> ) femelle.....	313
Bruant des roseaux mâle ( <i>Emberiza schoeniclus</i> ).....	315
Bruant des roseaux femelle ( <i>Emberiza schoeniclus</i> ) .....	316
Bruant jaune ( <i>Emberiza citrinella</i> ) .....	317
Bruant proyer ( <i>Emberiza calandra</i> ) .....	320

# 1. Généralité et jugement

## Dessin

### Caractéristiques

Dessin typique de la race selon le standard

### Points à disposition 30

Évaluations	Pénalisations	points
<b>EXCELLENT</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dessin caractéristique de l'espèce</li><li>• Sans dessin pour les mutations lipochrome</li></ul>	<b>29</b>
<b>BON</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Léger manque de dessin ou dessin légèrement flou</li><li>• Léger dessin apparent chez les mutations lipochromes</li></ul>	<b>28</b>
<b>SUFFISANT</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Manque de dessin ou flou.</li></ul>	<b>27 - 26</b>
<b>INSUFFISANT</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sans dessin ou très flou</li></ul>	<b>25 =&gt;</b>

## ***Couleurs***

### **Caractéristiques**

Couleur typique de la race selon le standard

### **Points à disposition 30**

<b>Évaluations</b>	<b>Pénalisations</b>	<b>points</b>
<b>EXCELLENT</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Aucun défaut</li></ul>	<b>29</b>
<b>BON</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Un ou deux défauts</li></ul>	<b>28</b>
<b>SUFFISANT</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Trois défauts ou des défauts graves.</li></ul>	<b>27 - 26</b>
<b>INSUFFISANT</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Plus de trois défauts e/o de façon voyante, plumage en mue sur tout le manteau</li></ul>	<b>25 =&gt;</b>

## **Forme & grandeur**

### **Caractéristiques**

Forme et grandeur typique de la race selon le standard

### **Défauts pénalisants :**

- Longueur : inférieure ou supérieure au standard
- Tête : aplatie ou trop petite, ou au contraire trop grande et pesante en proportion du corps
- dos : concave ou convexe
- poitrine : plate ou étroite ou proéminente et massive
- tronc : trop fin ou trop massif
- jambes : trop longues avec un tibia fin et cuisses visibles ou trop courtes ou recouvertes du plumage de l'abdomen.

### **Points à disposition 20**

<b>Évaluations</b>	<b>Pénalisations</b>	<b>points</b>
<b>EXCELLENT</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Aucun défaut</li></ul>	<b>19</b>
<b>BON</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Un ou deux défauts</li></ul>	<b>18</b>
<b>SUFFISANT</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Trois défauts ou des défauts graves.</li></ul>	<b>17</b>
<b>INSUFFISANT</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Plus de trois défauts e/o de façon voyante, plumage en mue sur tout le manteau</li></ul>	<b>16 =&gt;</b>

# PLUMAGE

## Caractéristiques

Le plumage se compose de plumes et de pennes. Il devra être complet, intact, uniforme, lisse, compact, serré et brillant.

Les pennes et les plumes devront se chevaucher les unes et les autres comme des tuiles bien ordonnées.

La queue et les ailes devront être compactes, fermées et intactes.

## Sont considérés comme défauts :

- Plumage trop long et abondant, qui rend le manteau moins compact.
- Plumage trop abondant sur les flancs, sourcils trop touffus et marqués.
- Coup de vent dans la gorge et sur la poitrine
- Plumage lâche sur un ou les deux flancs, à l'abdomen ou sur la poitrine
- Plumes de coq
- Dos avec des plumes qui ont tendance à se séparer
- Plumage court, rare et sec
- Mue pas terminée
- Rémiges et rectrices pas uniformes (avec des plumes en repousse)
- Rémiges et rectrices cassées
- Rémiges non complètes et pas uniformément en ligne
- Queue en éventail ou / et queue d'hirondelle

## Points à disposition 10

Évaluations	Pénalisations	points
<b>EXCELLENT</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Aucun défaut</li></ul>	<b>10</b>
<b>BON</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Un ou deux défauts</li></ul>	<b>9</b>
<b>SUFFISANT</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Trois défauts ou des défauts graves.</li></ul>	<b>8</b>
<b>INSUFFISANT</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Plus de trois défauts e/o de façon voyante, plumage en mue sur tout le manteau</li></ul>	<b>7 =&gt;</b>

Sont considérés comme « défauts graves », ceux qui sont particulièrement accentués.

## Maintien, conditions & impression

Attitude et position de l'oiseau, en mouvement, pas amorphe.

Condition de l'oiseau : bec court, ongles soignés

Impression : propreté de la cage, bien être de l'oiseau

### Caractéristiques

Par maintien, s'entend l'attitude du corps du sujet et comment il se présente sur le perchoir dans la cage.

Donc la forme et le maintien, souvent se comparent et s'influencent l'un l'autre. Un canari chez qui la forme laisse à désirer aura difficilement un bon maintien et vice-versa.

Un excellent maintien peut se résumer en : force, fierté et vivacité.

Au repos, le sujet doit présenter à une ligne corps-queue droite et continue ; et avoir une position d'environ 45 degrés par rapport au perchoir.

### Les défauts de pénalisations sont de deux types :

1. caractère
  - sauvage ou inquiet
  - timide et peureux
  
2. structurel
  - ailes portées trop basses et relâchées le long du corps
  - ailes croisées
  - queue portée trop basse avec une ligne corps queue concave ou convexe
  - membres raides sans la semi flexion normale de la cheville
  - Epaules saillantes
  - Bec : croissance anormale d'une mandibule

### **Points à disposition 10**

Évaluations	Pénalisations	points
<b>EXCELLENT</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Aucun défaut</li></ul>	<b>10</b>
<b>BON</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Un ou deux défauts</li></ul>	<b>9</b>
<b>SUFFISANT</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Trois défauts ou des défauts graves.</li></ul>	<b>8</b>
<b>INSUFFISANT</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Plus de trois défauts e/o de façon voyante, plumage en mue sur tout le manteau</li></ul>	<b>7 =&gt;</b>

<b>FICHE DE JUGEMENT</b>
--------------------------

Exposant	
Pays	
N° de l'éleveur	

<b>FAUNE EUROPEENNE</b>
-------------------------

Dénomination				
Bague				
Cage n°				

Dessin	30				
Couleur	30				
Forme et Grandeur	20				
Plumage	10				
Maintien, condition et impression	10				

<i>Total</i>	<i>100</i>				
--------------	------------	--	--	--	--


<b>Total pour le stam</b>	
<b>Harmonie</b>	
<b>Total pour la collection</b>	

Remarques :

Juges:

Date:

## « Topographie » d'un oiseau



## 2. Motacillidae :

Plumage comportant des tons gris, blancs noirs jaunes. Hochent la queue de haute en bas presque continuellement Marchent à petits pas rapides.

### *Bergeronnette*

#### Bergeronnette grise (*Motacilla alba*) ~ Phénotype ancestral ~

Taille du corps : 18 cm. Forme élégante et élancée. Assez haute sur pattes. Balance verticalement la queue.

Zones du plumage	Couleur
Tête Cou, gorge, nuque	<p><b>Plumage nuptiale :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• De forme elliptique, avec l'arrondi du crane élégant.</li><li>• Zone frontale et joues blanche jusqu'au-dessus de l'œil.</li><li>• Dessus du crâne et nuque noir.</li><li>• Plastron noir, couvrant le menton, la gorge et le haut du poitrail ou il se divise en arrondi</li></ul> <p><b>Plumage hivernal :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• La bavette se réduit à un demi-collier noir en forme de croissant</li><li>• Le menton et la gorge sont blancs</li><li>• Le noir du crâne devient gris foncé</li></ul>
Dos	Gris uniforme
Poitrine,	blanc
Flancs	Blanc, voilé de gris
Ventre, région anale	Blanc
Ailes	<ul style="list-style-type: none"><li>• Épaule grise</li><li>• Petites couvertures noires à bordure grise</li><li>• Grande couvertures grises à bordure blanche</li><li>• Grandes rémiges gris noir</li><li>• Rémiges secondaires noires bordées de blanc</li></ul>
Croupion	Gris
Queue	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rectrices externes blanches</li><li>• Rectrices centrales noires</li></ul>
Bec	Gris noirâtre. Assez long, fin et pointu

Yeux	Noirs
Pattes, doigts	Gris noirs
Ongles	noirs

***Remarques : la femelle présente des couleurs plus ternes et un dessin réduit.***





## Bergeronnette des ruisseaux (*Moticilla cinerea*)

### ~ Phénotype ancestral ~

Taille du corps : 18cm. Forme élégante et svelte. Haute sur pattes. Longue queue balancée verticalement.

Zones du plumage	Couleur
Tête	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De forme elliptique bien proportionnée au corps.</li> <li>• Dessus du crâne et nuque gris</li> <li>• Joues grises rejoignant la nuque</li> <li>• Zone loreale grise.</li> <li>• Trait sourcilier blanc</li> <li>• Trait moustachal blanc servant de délimitation entre la joue et la bavette</li> </ul> <p>en plumage nuptial</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bavette noire couvrant le menton et la gorge.</li> </ul> <p>En hiver</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le noir de la bavette est remplacé par une couleur blanche qui peu être légèrement moucheté de noir</li> </ul>
Cou, nuque	Gris
Dos	Gris uniforme
Poitrine, gorge	Jaune citron, couvrant toute la face ventral
Flancs	Jaune, parfois légèrement teinté de gris verdâtre à hauteur de l'épaule
Ventre, région anale	Jaune citron
Ailes	Gris foncé voilé de brun Extrémité des grandes couvertures internes frangée de blanc Grandes rémiges gris noir, les secondaires étant bordées de blanc
Croupion	Jaune verdâtre
Queue	Longue Rectrices externes blanches Rectrices internes gris noirâtre
Bec	Gris noirâtre. assez long, pointu
Yeux	Noirs. Léger cercle oculaire blanc
Pattes, doigts	Couleur chair. Pattes longues et fines
Ongles	Couleur chair

**Remarques : la femelle est dépourvue de bavette noire et présente un menton et une gorge blanchâtre. L'ensemble des couleurs est un peu plus pâle que chez le mâle.**



## Bergeronnette printanière (*Moticilla flava*)

### ~ Phénotype ancestral ~

Taille du corps : 17cm. Forme élancé et élégante. Haute sur pattes

Zones du plumage	Couleur
Tête	<p>Fine, crane assez plat</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Front, dessus de la tête et nuque, gris clair</li><li>• Trait sourcilier, blanc</li><li>• Dessin de la joue, gris foncé</li><li>• Menton et gorge jaune, comme la face ventrale. Blanchâtre en hiver</li></ul> <p>Il existe plusieurs sous espèces dont la couleur de tête diffère.</p>
Cou, nuque	Gris clair
Dos	Gris beige verdâtre
Poitrine, gorge, Flancs Ventre, région anale	Jaune citron, plus pâle en hiver
Ailes	<ul style="list-style-type: none"><li>• Couvertures gris foncé, bordée de blanc</li><li>• Rémiges gris brun foncé, avec bordure blanchâtre</li></ul>
Croupion	Gris verdâtre
Queue	<p>Assez longue</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Rectrices externes blanches</li><li>• Rectrices internes, gris brun foncé</li></ul>
Bec	Gris
Yeux	Noirs. Léger cercle oculaire
Pattes, doigts	Gris
Ongles	Gris

***Remarques : la femelle est plus pâle que le mâle***



### 3. Bombycillidae :

## Jaseur

### Jaseur boréal (*Bombycilla garrulus*)

~ Phénotype ancestral ~

Taille du corps : 18 cm

Zones du plumage	Couleur
BEC	Noir avec une couleur chair à la racine. Une ligne blanche est visible à la base de la mandibule inférieure.
YEUX	Brun foncé.
TETE	Possède une huppe érectile de couleur lie de vin. Front, lorums, traits sourciliers, menton et gorge : noir. La couleur du front et de l'avant des joues est rouille. La région auriculaire, les joues, le haut de la poitrine et l'occiput sont lie de vin..
DOS	Manteau, scapulaires et couvertures alaires sont de couleur brun foncé, devenant graduellement gris vers le sus caudale..
POITRINE	Gris brunâtre pâle.
VENTRE et FLANCS	Gris brunâtre pâle. Le centre du ventre est jaunâtre
AILES	Rémiges primaires : noires, bordées d'une ligne blanche avec l'extrémité du vexille externe jaune. Rémiges secondaires : de couleur noir grisâtre avec à leur extrémité une large tache blanche, terminée par des spots cornés rouge vif
QUEUE	Rectrices : grises à la racine, devenant graduellement noirâtres. L'extrémité des rectrices est jaune, ceci forme une bande jaune à l'extrémité de la queue. Sous-caudale : roux.
PATTES, DOIGTS & ongles	Noir



Photo UOF P. Rocher

Photo UOF P. Roehrer



## 4. Prunellidae :

Petits oiseaux terrestres ressemblant à des moineaux mais différant par ; un bec fin d'insectivore et flancs striés. Sautillent ou marche comme s'ils se trainaient, entrouvrant souvent les ailes.

### *Accenteurs*

#### Accenteur mouchet (*Prunella modularis*)

#### ~ Phénotype ancestral

Taille du corps : 15 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dessin brun finement strié</li><li>• Zone loreale et joues brun légèrement strié</li><li>• Sourcil gris bleuté qui se prolonge sur le côté du cou en contournant la joue et s'étale sur le menton et la gorge</li></ul>
Cou, nuque	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nuque brune légèrement striée</li><li>• Côtés du cou gris bleuté</li></ul>
Dos	Brun marqué de larges stries brun noir
Poitrine, gorge	Gris bleuté uniforme, qui se dégrade e gris beiges crémeux vers le ventre
Flancs	Brun roux strié de gris noirâtre
Ventre, région anale	Gris beige crémeux, strié de noir en zone anale
Ailes	<ul style="list-style-type: none"><li>• Couvertures brun foncé avec liseré clair en partie inférieure, dessinant une double barre alaire peu distincte</li><li>• Grandes rémiges brun roux, plus foncé à l'extrémité</li><li>• Rémiges secondaires brun noirâtre, légèrement bordées de blanc</li></ul>
Croupion	Gris brun
Queue	Rectrices brun noirâtre
Bec	Gris noirâtre
Yeux	Noirs
Pattes, doigts	Brun rougeâtre

*Remarques : silhouette fine et élégante. Pas de dimorphisme sexuel important.*





## Accenteur alpin (*Prunella colleris*) ~ Phénotype ancestral ~

Taille du corps : 18cm. Forme robuste. Tête ronde sans encolure marquée

Zones du plumage	Couleur
Tête	Ronde Crâne et joues gris bleuté Menton et gorge marqués d'une bavette blanchâtre finement écaillée de noir
Cou, nuque	Encolure et cou peu marqués Nuque gris bleuté comme le crâne
Dos	Gris brun, marqué de larges stries brun noirâtre
Poitrine, gorge	Bavette blanchâtre écaillée de noir, couvrant toute la gorge Poitrail gris
Flancs	Fortement marqué de stries brunes sur fond gris brun
Ventre, région anale	Gris comme le poitrail, s'éclaircissant sur le bas ventre Zone sous caudale blanchâtre striée de brun noir
Ailes	Scapulaires et couvertures gris noirâtre, dont l'extrémité blanche forme une double barre alaire. Grandes rémiges gris brun plus clair sur le vexille externe Rémiges secondaires brun noir avec liseré brun clair virant au blanc à l'extrémité
Croupion	Gris brun, strié de noir
Queue	Rectrices brun foncé, noirâtre dans l'axe central
Bec	Fin, pointu. Gris noir marqué de jaune près des commissures.
Yeux	Noirs
Pattes, doigts	Brun grisâtre
Ongles	Brun grisâtre

**Remarques : pas de dimorphisme sexuel important**

## 5. Turdidae :

Vaste famille réunissant plusieurs des meilleurs chanteurs européens. Tous sont insectivores et frugivores. Ils courent ou sautillent.

### *Rossignols*

#### Rossignol philomèle (*Lusciama megarhymchos*)

##### ~ Phénotype ancestral ~

Taille du corps : 17cm. forme élégante. Assez rebondi. Tête ovale. Encolure peu marquée. Assez haut sur pattes

Zones du plumage	Couleur
Tête	<ul style="list-style-type: none"><li>• Assez fine, plus arrondie à la nuque</li><li>• Crane et joues brun roux</li><li>• Peut porter un léger sourcil gris</li></ul>
Cou, nuque	Brun assez soutenu
Dos	Brun uniforme
Poitrine, gorge	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dessous du bec blanchâtre</li><li>• Poitrail beige clair uniforme</li></ul>
Flancs	Beige clair
Ventre, région anale	Blanchâtre
Ailes	Brunes, plus foncées sur leur partie centrale
Croupion	Brun roux soutenu
Queue	Brun roux soutenu
Bec	Gris. Fin et pointu
Yeux	Noirs. Assez grands. Léger cercle oculaire
Pattes, doigts	Couleur chair
Ongles	Couleur chair

**Remarques : pas de dimorphisme sexuel. Peut être confondu avec le rossignol progré**

## Rossignol progné (*Lusciana lusciانا*)

### ~ Phénotype ancestral ~

Taille du corps : 17cm. Forme élégante. Tête ovale à encolure faiblement marquée. Assez haut sur pattes

Zones du plumage	Couleur
Tête	Assez fine. plus arrondi sur la nuque. Crane brun clair, joues brun grisâtre. Dessus du bec crème grisâtre
Cou, nuque	Brun clair comme le crane
Dos	Brun clair uniforme
Poitrine, gorge	Gris beige, très légèrement écaillé de gris foncé
Flancs	Gris beige très légèrement écaillé
Ventre, région anale	Blanchâtre, un peu plus foncé à la zone anale
Ailes	Brunes, rémiges légèrement plus clair sur le pourtour. Rémige secondaires un peu plus brunes Les grandes rémiges sont assez longues
Croupion	Brun roux
Queue	Brun roux comme le croupion
Bec	Gris. Fin et pointu
Yeux	Noirs. Assez grands. Enchâssés assez haut sur le crane. Léger cercle oculaire
Pattes, doigts	Couleur chair
Ongles	Couleur chair

***Remarques : pas de dimorphisme sexuel. Peut-être confondu avec le rossignol Philomèle***

# Rouge-gorge

## Rouge gorge (*Erithacus rubecula*) ~ Phénotype ancestral ~

Taille du corps : 14cm. Forme arrondie assez trapue. Haut sur pattes

Zones du plumage	Couleur
Tête	<ul style="list-style-type: none"><li>• Calotte crânienne brune</li><li>• Front et face roux orangé lumineux</li><li>• Arrière de la joue gris</li></ul>
Cou, nuque	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cou épais</li><li>• Nuque brune</li></ul>
Dos	Brun uniforme
Poitrine, gorge	Roux orangé comme la face
Flancs	<ul style="list-style-type: none"><li>• Haut des flancs gris bleu en forme de bandes remontant jusqu'à l'arrière de la joue</li><li>• Bas des flancs chamois clair</li></ul>
Ventre, région anale	Blanc sale
Ailes	Couvertures et rémiges brunes uniforme comme le dos
Croupion	Brun
Queue	Rectrices brunes
Bec	Noirâtre. Assez long. Pointu
Yeux	Noirs. Assez grands, enchâssé au centre de la tête
Pattes, doigts	Brun
Ongles	brun

**Remarques : pas de dimorphisme sexuel apparent.**



Standard K.B.O.F.





# Calliope

## Calliope sibérienne (*Lusciana calliope*)

### ~ Phénotype ancestral ~

Taille du corps : 15cm. Forme fuselée et élancée. Assez haut sur pattes

Zones du plumage	Couleur
Tête	Ovale de forme élégante. Mâle : Crane brun clair. Sourcil blanc. large trait moustache blanc souligné de noir Zone loreale et joues gris noir Dessous du bec rouge carmin lumineux.
Cou, nuque	Brun clair comme la tête
Dos	Brun clair comme la tête
Poitrine, gorge	Chez le mâle, la gorge porte une bavette rouge carmin lumineuses, qui peut être très légèrement délimitée de noir Zone gris beige sur le haut du poitrail, se dégradant en beige
Flancs	Beige
Ventre, région anale	Blanc crémeux du bas du poitrail à la zone anale
Ailes	Épaule et rémiges brunes
Croupion	Brun foncé
Queue	Brun foncé
Bec	Assez long et fin. Gris noirâtre
Yeux	Noirs
Pattes, doigts	Gris brun
Ongles	Gris brun

***Remarques : la femelle porte une livrée brune assez uniforme, avec sourcils et trait moustaches atténués. Bavette et zone ventrale blanc crémeux***

## George bleu à miroir (*Lusciana svecica*)

### ~ Phénotype ancestral ~

Taille du corps : 14cm. Forme du corps ronde, voisine de celle du rouge-gorge. Haut sur patte. Se tient souvent queue dressée et ailes tombantes

Zones du plumage	Couleur
Tête	<b>Mâle :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Dessus du crane gris brun</li><li>• Zone loreale et joue grise brun très légèrement écaillé</li><li>• Trait sourcilier blanchâtre</li><li>• Menton et gorge bleu lustré</li></ul>
Cou, nuque	Gris brun un peu plus clair que la tête
Dos	Gris brun
Poitrine, gorge	<b>Mâle :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Dessin en forme de bavette bleu intense, lumineux à reflet satiné jusqu'en haut du poitrail et portant en son centre un ocelle de forme ovale, blanche (ssp <i>L.s.svecica</i>), centre rouge (ssp. <i>L. s.cynecula</i>).</li><li>• Le bas de la bavette est bordé de noir, puis soulignée d'une bande rousse.</li></ul>
Flancs	Beige rosâtre à la partie inférieure
Ventre, région anale	Partie inférieur du poitrail, zone ventrale et anale blanc grisâtre
Ailes	Gris brun comme le dos. Partie centrale des rémiges plus foncé
Croupion	Gris brun
Queue	Partie inférieure des rectrices rousse (très visible en vol) se dégradant en brun noirâtre à l'extrémité
Bec	Gris noirâtre
Yeux	Noirs. Assez grand
Pattes, doigts	Brun noirâtre
Ongles	Brun noirâtre

Remarques : la femelle porte à la gorge une bavette blanchâtre délimitée de brun noir (parfois teintée de bleu à l'état adulte) le reste de la livrée est gris brun, plus clair sur le ventre.





**Standard COM/OMJ Edition 2014.  
Mise à jour partielle CNJF Aout 2022.**

# Tariers

## Tarier pâtre (*saxicola torquata*) mâle ~ Phénotype ancestral ~

Taille du corps : 12cm.


Zones du plumage	Couleur
Tête	Ronde. Robuste par rapport au corps La tête est entièrement noire de couleur uniforme qui se prolonge sur la nuque, les joues et la gorge.
Cou, nuque	Partie dorsale de la nuque noire qui rejoint le dos. côtés du cou blanc pur, de la base de la joue à l'épaule.
Dos	Gris noir, marqué de stries noires
Poitrine, gorge	Gorge noire nettement délimitée du poitrail. Poitrail roux lumineux se dégradant en blanc en partie inférieure.
Flancs	Roux comme le poitrail
Ventre, région anale	Blanchâtre
Ailes	Épaule et couvertures carpiennes noires. Grandes couvertures blanche en forme de barre claire. Rémiges noires finement liserées de gris foncé
Croupion	Blanc marqué de noir
Queue	Noire
Bec	Noir. Fin et pointu
Yeux	Noirs
Pattes, doigts	Gris brun foncé
Ongles	Gris brun foncé

***Remarques : forme générale trapue, mais harmonieuse***

Photo Rafael Rios Arenas



Photo Rafael Rios Arenas



Juvenile

## Tariet pâtre (*saxicola torquata*) femelle ~ Phénotype ancestral

Taille du corps : 12cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	Assez massive. Même capuchon que le mâle, de couleur gris brun avec des stries plus foncées
Cou, nuque	Nuque gris brun. demi-collier blanchâtre sur les côtés du cou
Dos	Gris brun portant des stries foncées larges et régulières
Poitrine, gorge	Gorge brun noirâtre nettement délimitée. Poitrail gris beige se dégradant en blanc pâle
Flancs	Gris beige
Ventre, région anale	Blanchâtre
Ailes	Épaule et couvertures carpiennes brun noirâtre à liseré plus clair. Grandes couvertures blanchâtre en forme de barre claire
Croupion	Gris beige strié de brun foncé
Queue	Brun noirâtre
Bec	Gris brun foncé
Yeux	Noirs
Pattes, doigts	Gris brun foncé
Ongles	Gris brun foncé

***Remarques : le 1<sup>er</sup> hiver, les femelles sont de couleur plus claire, brun noirâtre.***



## Tariet des prés (*saxicola rubetra*) ~ Phénotype ancestral

Taille du corps : 12,5cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	<p>Mâle :</p> <p>Dessous de la tête gris beige fortement strié de noir.</p> <p>Sourcil blanc partant de la base du bec et s'élargissant vers l'arrière de l'œil.</p> <p>Zone loreale et joues brun noirâtre, un peu plus clair au centre. la joue est surlignée d'un trait blanc qui la contourne jusqu'à la nuque</p>
Cou, nuque	Gris brun strié de noir
Dos	Gris brun strié de noir
Poitrine, gorge	Dessous du bec, gorge et poitrail chamois orangé se dégradant en blanc
Flancs	Chamois orangé s'estompant vers le bas
Ventre, région anale	Blanc crémeux
Ailes	<p>Couvertures brun noir à liseré clair.</p> <p>Une partie des couvertures et portent une tache blanche.</p> <p>Rémiges brun noir foncés à leurs extrémités et comportant un liseré gris beige</p>
Croupion	Gris brun strié de noir
Queue	Rectrices brun noirâtre
Bec	Gris noir. Fin et pointu
Yeux	Noirs
Pattes, doigts	Gris noir
Ongles	Gris noir

***Remarques : la femelle présente le même patron avec des couleurs très atténuées, principalement sur le poitrail.  
En plumage hivernale, les mâles sont de couleurs moins vives.***

# Rouges-queues

## Rouge queue noir (*Phoenicurus ochuros*)

### ~ Phénotype ancestral

Taille du corps : 14cm. Forme élancée et élégante. Tête bien proportionnée au corps. Pattes longues

Zones du plumage	Couleur
Tête	Mâle : <ul style="list-style-type: none"><li>• Dessus du crane gris anthracite jusqu'à la hauteur de l'œil</li><li>• Fine bande frontale, joues et menton noir se prolongeant sur la gorge</li></ul>
Cou, nuque	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nuque gris anthracite</li><li>• Côtés du cou noir</li></ul>
Dos	Gris noir plus foncé que le crâne
Poitrine, gorge	<ul style="list-style-type: none"><li>• Noir lustré</li><li>• La zone inférieure du poitrail se dégrade en gris foncé vers le ventre</li></ul>
Flancs	Gris foncé uniforme
Ventre, région anale	Ventre gris foncé, se fondant en brun rouille sur la partie anale
Ailes	<ul style="list-style-type: none"><li>• Couvertures noires légèrement liserés de gris</li><li>• Rémiges gris foncé, portant une zone claire à la partie médiane, en forme de miroir alaire</li></ul>
Croupion	Roux
Queue	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rectrices externes rousses</li><li>• Rectrices internes rousses à la base devenant noirâtre</li></ul>
Bec	Noir assez long, fin et pointu
Yeux	Noir
Pattes, doigts	<ul style="list-style-type: none"><li>• Noir</li><li>• Tarse long</li></ul>
Ongles	noirs

**Remarques :** la femelle présente une livrée gris brun unie, un peu plus foncée sur la partie dorsale. L'œil est entouré d'un cercle clair, très fin. la couleur de la queue est identique à celle du mâle.

**En première année les mâles peuvent présenter un plumage intermédiaire entre mâle et femelle.**





Standard K.B.O.F.

## Rouge queue à front blanc (*Phoenicurus phoenicurus*) ~ Phénotype ancestral ~

Taille du corps : 14cm. Forme élancée et élégante. Tête bien proportionnée au corps. Pattes longues

Zones du plumage	Couleur
Tête	<b>Mâle :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fine bande frontale noire, nettement délimitée d'une bande blanche plus large qui se prolonge au-dessus de l'œil.</li> <li>• Sommet et partie arrière du crâne gris souris.</li> <li>• Masque noir couvrant les joues, le menton et la gorge</li> </ul>
Cou, nuque	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nuque et partie dorsale du cou gris souris</li> <li>• Côtés du cou noir comme les joues et la gorge</li> </ul>
Dos	Gris souris
Poitrine, gorge	Gorge noire en prolongement du dessin facial, nettement délimité du poitrail roux lumineux
Flancs	Toute la partie poitrail et flancs sont de couleur rousse uniforme et lumineuse
Ventre, région anale	Ventre blanc, se dégradant en roux vers la région anale
Ailes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Petites couvertures gris foncé</li> <li>• Grandes couvertures noires finement bordées de gris</li> <li>• Rémiges noires avec un liseré gris brun</li> </ul>
Croupion	Roux
Queue	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rectrices externes rousse</li> <li>• Rectrices centrales rousses à la base, devenant noirâtres jusqu'à leurs extrémités</li> </ul>
Bec	Noir. Assez long. Fin et pointu
Yeux	Noir
Pattes, doigts	Noirâtre. Tarse long
Ongles	noir

**Remarques :** *la femelle est de couleur gris brun sur la tête et la partie dorsale. Les rémiges sont brun noirâtre avec une bordure gris brun. Croupion et queue comme le mâle. Gorge gris brun. Poitrail et flancs gris beige incrusté de chamois. Ventre blanchâtre. Zone anale rousse. En première année les mâles peuvent présenter un plumage intermédiaire entre mâle et femelle.*



# Monticules

## Merle bleu (*Monticola solitarius*) ~ Phénotype ancestral ~

Taille du corps : 20cm. Oiseau élégant et bien équilibré

Zones du plumage	Couleur
Tête	Bien dégagée du corps, assez plate, en gris-ardoise très nettement bleuté. Trait loreal : sombre. Cercle oculaire : clair.
Cou, nuque	Gris-ardoise bleuté.
Dos	Gris-ardoise bleuté, légèrement ombré.
Poitrine, gorge	Gris-ardoise bleuté
Flancs	Gris-ardoise bleuté.
Ventre, région anale	Gris-noirâtre, avec reflet bleu
Ailes	Rémiges et couvertures : noirâtres, portant un liseré gris-bleuté.
Croupion	Gris-ardoise bleuté.
Queue	De longueur moyenne Rectrices : noirâtres, finement liserées de gris-bleuté.
Bec	Gris-noir, long, pointu mais robuste.
Yeux	Noir, assez grands
Pattes, doigts	Gris-noirâtre, assez longues
Ongles	Noir mat

***Remarques : La femelle porte une livrée brun-ocre soutenu avec un écaillage noirâtre sur la tête, le dos et la face ventrale où il est plus visible***

## Merle de roche (*Monticola saxatilis*)

### ~ Phénotype ancestral ~

Taille du corps : 19cm. Oiseau élégant et proportionné. Position dressée.

Zones du plumage	Couleur
Tête	Bien dégagée du corps, légèrement plate d'une couleur grise-brune tachetée en noire et blanche avec un léger voile bleuâtre que couvre la tête
Cou, nuque	D'une couleur pareille à la tête mais plus blanchâtre du côté antérieur (gorge).
Dos	Gris-brun tachetée en noir et blanc
Poitrine, gorge	Orangée et avec un dessin écaillé en noir et blanc.
Flancs	Semblable à la poitrine mais plus orangé et les écailles sont plus petites
Ventre, région anale	Orangée et avec un dessin écaillé en noir et blanc
Ailes	Rémiges et couvertures alaires noirâtres avec un clair liséré plus évident dans ces dernières
Croupion	Gris-brun tachetée en noir et blanc
Queue	Courte, d'une couleur châtain-orangée avec deux rectrices centrales brunes fonces Châtain-orangée.
Bec	Grisâtre, plus foncé vers l'extrémité. long et pointu
Yeux	Noirs et grands avec cercle oculaire clair
Pattes, doigts	Brunâtres.
Ongles	Noirâtres.

***Remarques : Femelle : Couleurs plus pâles et ternes. En général d'une couleur brunâtre et très tachetée, spécialement sur la poitrine et le ventre où les tâches ont une forme d'écailles***

# Merles

## Merle noir mâle (*Turdus merula*) ~ Phénotype ancestral ~

Taille du corps : 24/25 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	La totalité du plumage est uniformément noire
Dos	idem-
Gorge, poitrine	idem-
Flancs, ventre	idem-
Ailes	Noir. <ul style="list-style-type: none"><li>• En 1<sup>ère</sup> année, brun noirâtre</li></ul>
Croupion	idem-
Queue	Noir. <ul style="list-style-type: none"><li>• En 1<sup>ère</sup> année, brun noirâtre</li></ul>
Yeux	Noir. Cercle oculaire jaune à orange
Bec	Jaune à orange
Pattes, doigt, ongles	Gris brun



## Merle noir femelle (*Turdus merula*) ~ Phénotype ancestral ~

Taille du corps : 24/25 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	Gris brun foncé
Dos	idem-
Gorge, poitrine	Menton gris beige pointillé noir. Poitrail brun écaillé
Flancs, ventre	Brun écaillé brun foncé
Ailes	Gris brun foncé
Croupion	idem-
Queue	idem-
Yeux	Brun noir
Bec	Brun foncé. Peut porter des marques jaunes
Pattes, doigt, ongles	Brun foncé



Photo Lionel Durochat

## Merle noir mâle ~ Mutation pastel ~

Taille du corps : 24/25 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	Grises, légèrement striée
Dos	Gris argenté, avec un liseré foncé sur les couvertures et de légères striées sur le milieu.
Gorge, poitrine	Gris argenté, avec de légères stries interrompues.
Flancs, ventre	Gris argenté avec un dessin en forme de gouttes.
Ailes	Rémiges primaires gris foncé avec une barre alaire gris clair (les jeunes oiseaux ont des scapulaires foncées).
Croupion	Gris argenté avec un liseré foncé sur les couvertures.
Queue	Gris foncé, plus claire que les rémiges primaires.
Yeux	Brun foncé avec cercle oculaire jaunâtre.
Bec	Jaune orange chez l'adulte.
Pattes, doigt, ongles	Bruns.



## Merle noir femelle ~ Mutation pastel ~

Taille du corps : 24/25 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	Gris très foncé avec un léger pigment et liseré.
Dos, gorge, poitrine	Gris foncé, légèrement striés.
Flancs, ventre	Gris foncé, avec un dessin en forme de gouttelettes.
Ailes	Gris foncé (les jeunes oiseaux ont des scapulaires encore plus foncées).
Croupion	Gris foncé, légèrement striés.
Queue	Gris très foncé.
Yeux	Brun foncé avec un cercle oculaire orange.
Bec	Brun foncé à base orangée.
Pattes, doigt, ongles	Bruns.



## Merle noir ~ Mutation ino (ex-albino)~

Taille du corps : 24/25 cm

Zones du plumage	Couleur
Corps	Blanc légèrement coloré.
Ailes	Blanches.
Queue	Blanche.
Yeux	Rouges avec cercle oculaire jaunâtre.
Bec	Jaune.
Pattes, doigts	Couleur chair.
Ongles	Couleur chair.

Le blanc pur à yeux rouge est dénommé albino



## Merle noir ~ Mutation blanc ~

Taille du corps : 24/25 cm

Zones du plumage	Couleur
Corps	Blanc.
Ailes	Blanches.
Queue	Blanche.
Yeux	Noirs avec cercle oculaire jaunâtre.
Bec	Jaune.
Pattes, doigts	Couleur chair.
Ongles	Couleur chair.



## Merle à plastron (*Turdus torquatus alpestris*) ~ Phénotype ancestral ~

Taille du corps : 24cm. Harmonieuse, svelte

Zones du plumage	Couleur
Tête	Fine et élégante, bien dégagée du corps en noir mat.
Cou, nuque	Assez long en noir mat.
Dos	Noir mat. Les plumes sont ourlées d'une fine bordure grisâtre bien nette
Poitrine, gorge	<i>Poitrine</i> : Le haut de la poitrine porte une marque blanche nette, horizontale, en forme de croissant, formant un demi-collier d'une épaule à l'autre. <i>Partie basse du poitrail</i> : noir mat, indistinctement écaillé de grisâtre <i>Gorge</i> : Noir mat.
Flancs	Noir mat, portant un écaillage grisâtre bien contrasté et régulier
Ventre, région anale	Noir mat, écaillé, s'unissant sur la zone anale.
Ailes	<i>Rémiges</i> : noires, liserées de gris-blanchâtre sur les deux tiers inférieur de leur longueur, ce qui détermine une zone claire sur la partie médiane de l'aile <i>Couvertures</i> : noires, bordées de gris-blanchâtre Les ailes sont longues et fines
Croupion	Noir mat.
Queue	Rectrices : noir mat. La queue est assez longue.
Bec	Long, pointu et robuste Jaune à la base, passant au noir à la pointe
Yeux	Noir, assez grands. Cercle oculaire : très peu marqué.
Pattes, doigts	Assez longues, robustes et noires.
Ongles	Noir

***Remarques* : Le noir est remplacé par un brun sombre. Le dessin du poitrail est crème-grisâtre. L'écaillage est plus nettement marqué sur le dos et les flancs. La gorge est crème-grisâtre mouchetée de brun sombre**



# Grives

## Grive musicienne (*Turdus philomelos*) ~ Phénotype ancestral ~

Taille du corps : 23 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	Vertex et occiput brun chaud. Vertex pointillé brun foncé. Sourcil et cercle oculaire crème. Lore noir brun pointillé crème. joue brun pointillé noir
Gorge	Beige clair uni. Délimitée par deux traits foncés
Dos	Brun chaud. Croupion et sous caudales bruns
Poitrine	Beige clair. Dessin brun foncé en forme de pointe de flèche
Couvertures	Brun légèrement liseré de blanc formant une légère barre alaire
Rémiges	Brun foncé chaud. Liseré externe plus clair
Croupion	Brun
Queue	Brun foncé chaud
Yeux	Brun foncé
Bec	Brun noir. Base inférieure jaunâtre
Pattes, doigts	Rose chair
Ongles	Foncés

Photo UOF P. Rocher



## Grive musicienne ~ Mutation brun ~

Taille du corps : 23 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	Brun clair.
Gorge	Couleur crème
Dos	Brun clair.
Poitrine	Crème avec dessin brun clair en forme de gouttes.
Couvertures	Petites et moyennes couvertures brun clair. grandes couvertures brun clair avec dessin scapulaire crème.
Rémiges	Brun clair.
Croupion	Brun clair.
Queue	Brun clair.
Yeux	Bruns.
Bec	Couleur chair.
Pattes, doigts	Couleur chair.
Ongles	Couleur chair.

Photo UOF S. Chartier



## Grive musicienne ~ Mutation blanche ~

Taille du corps : 23 cm

Zones du plumage	Couleur
Corps	Blanc pur sans aucun dessin.
Ailes	Blanches.
Queue	Blanche.
Yeux	Rouges.
Bec	Noirs.
Pattes, doigts	Couleur chair.
Ongles	Couleur chair.

*Remarque : il existe aussi une mutation albinos qui se différencie de la mutation blanche par la couleur rouge de l'œil.*

Photo Drizsmans



## Grive musicienne ~ Mutation satiné ~

Taille du corps : 23 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	Crème clair avec des écailles brun clair sur le vertex et un voile brun clair sur les joues.
Gorge	Crème clair. Moustaches brun clair visibles de chaque côté de la gorge.
Dos	Crème clair.
Poitrine, flancs	Crème clair avec dessin brun clair en forme de gouttes bien réparties sur la poitrine.
Couvertures	Crème clair avec un dessin d'épaulé et une barre alaire brun clair.
Croupion	Crème clair.
Queue	Crème clair avec un dessin brun clair visible aux sous-caudales.
Yeux	Rouge foncé.
Bec	Couleur chair.
Pattes, doigts	Couleur chair.
Ongles	Couleur chair.



## Grive draine (*Turdus viscivorus*) ~ Phénotype ancestral ~

Taille du corps : 27 cm

Zones du plumage	Couleur
BEC	De couleur corne foncée avec la base de la mandibule inférieure jaune
YEUX	Brun avec cercle oculaire gris blanchâtre
TETE	Gris brun à brun. Lorum : gris blanc. Région auriculaire : gris blanc avec liserés plus foncés.
DOS	Brun à gris brun avec une nuance jaunâtre plus claire.
MENTON et GORGE	Jaunâtre, teinté de brun avec un dessin de petites taches brun foncé. Dessin des moustaches : brun foncé et pas très net
POITRINE	Le haut de la poitrine est jaunâtre avec un dessin de petites taches brun foncé en forme de pointes de flèches qui s'agrandissent progressivement sur la poitrine.
VENTRE et FLANCS	Jaune brunâtre avec un dessin de taches brun foncé
AILES	Rémiges de couleur brun foncé avec un liseré plus clair le long du vexille externe. L'extrémité des rémiges est blanchâtre. Les grandes, les moyennes et les petites couvertures sont de couleur brun foncé avec un liseré plus clair.
QUEUE	Rectrices de couleur brun grisâtre avec un liseré plus clair le long du vexille externe.
CROUPION	Brun à brun gris.
SUS CAUDALE	Brun à gris brun avec liseré blanc.
PATTES et DOIGTS	De couleur jaune brunâtre.
ONGLES	Foncé

**Pas de dimorphisme sexuel : *Il n'y a pas de dimorphisme marqué entre les sexes.***

### Défauts classiques les grives draines mâles et femelles

- Dessin de la poitrine irrégulier.
- Sourcils irrégulier
- Cercles oculaires irréguliers.
- Dessin des couvertures pas net.



## Grive mauvis (*Turdus iliacus*) ~ Phénotype ancestral ~

Taille du corps : 21 cm

Zones du plumage	Couleur
BEC	Brun noir avec la base de la mandibule inférieure jaunâtre
YEUX	De couleur noirâtre
TETE	Longs sourcils réguliers de couleur crème. Moustaches de couleur crème. Lorums de couleur brun foncé. Région auriculaire de couleur brun foncé avec une nuance crème Long trait de couleur crème en dessous de l'œil. Couronne de couleur brun foncé avec des écailles noires.
COU	Brun foncé avec une tache beige de chaque côté du cou.
MANTEAU	Brun foncé avec un léger dessin écaillé.
CROUPION	Brun, un peu plus clair que le manteau.
SUS CAUDALE	Brun, un peu plus clair que le manteau.
MENTON et GORGE	Blanc sale avec un dessin strié brun. La gorge est bordée d'une bande noirâtre découpée et qui suit les moustaches.
POITRINE	Blanc sale, tachetée de brun foncé.
FLANCS	Brun rouge à la partie supérieure des flancs et blanc sale, strié de brun à la partie inférieure des flancs
VENTRE	Blanchâtre.
AILES	De couleur brun foncé avec le vexille externe des rémiges beige. Les grandes sus alaires sont ourlées de beige.
QUEUE	De couleur brun foncé.
SOUS CAUDALE	Blanc sale avec un dessin écaillé de brun
PATTES et DOIGTS	De couleur chair foncé.
ONGLES	Noir.

*Dimorphisme sexuel : Il n'y a pas de dimorphisme marqué entre les sexes.*

### Défauts classiques des grives mauvis et femelles

- Sourcils irréguliers.
- Dessin de la poitrine irrégulier.
- Barre alaire irrégulière.
- Moustaches irrégulières.
- Couleur des flancs pas assez visible.

Photo RBOF



## Grive litorne (*Turdus pilaris*) ~ Phénotype ancestral ~

[Taille du corps](#) : 25 cm

Zones du plumage	Couleur
BEC	Jaune orange avec l'extrémité et une partie de la mandibule supérieure noir brunâtre
YEUX	Brun foncé.
TETE	Front et vertex : bleu grisâtre avec un dessin en forme de pointe de flèche noirâtre. Lorum : noir. Partie située en dessous de l'œil : noir. Sourcils : gris blanc. Voile gris clair sur les régions auriculaires. Nuque et occiput : bleu grisâtre
DOS	Manteau et couvertures alaires brun foncé avec des liserés plus clairs.
CROUPION	Bleu grisâtre. Couvertures sus caudales : brunâtres.
MENTON et GORGE	Jaune roux avec un dessin en forme de pointe de flèche noirâtre.
POITRINE	D'un brun chaud avec un dessin en forme de grand fer de lance noir.
VENTRE	Blanchâtre
FLANCS	Brun chaud avec un dessin en forme de grand fer de lance noir
AILES	Rémiges de couleur brun noir avec les liserés externes grisâtres. L'extrémité des rémiges secondaires blanchâtres.
QUEUE	Rectrices de couleur brun noir avec des liserés externes plus clairs sur la paire de rectrices externes.
PATTES et DOIGTS	De couleur brune.
ONGLES	Brun foncé.

*Dimorphisme sexuel : La femelle a les mêmes caractéristiques que le mâle mais les parties grises du mâle sont plus brunes chez la femelle. Les dessins noirs de la tête sont plus petits. Les flancs sont plus brunâtres.*



## 6. Sylviidae :

Petits passereaux insectivores. Sexes généralement semblables, juvéniles comme adultes.

### *Fauvettes*

#### Fauvette à tête noire (*Sylvia atricapilla*)

~ Phénotype ancestral ~

Taille du corps : 14cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	<b>Mâle :</b> Calotte noire de la base du bec à l'arrière du crâne sans empiéter sur l'œil. Zone loreale entre le bec et l'œil et joues gris clair. Dessous du bec gris blanchâtre virant en gris sur le poitrail
Cou, nuque	Gris légèrement voilé de beige
Dos	Gris légèrement voilé de beige
Poitrine, gorge	Gris clair
Flancs	Gris clair
Ventre, région anale	Blanc sale
Ailes	Couvertures et rémiges gris beige, plus foncé à l'extrémité et liseré plus clair
Croupion	Gris
Queue	Gris beige comme les rémiges
Bec	Noir. Fin et pointu
Yeux	Noirs
Pattes, doigts	Gris noir
Ongles	Gris noir

Remarques : la femelle porte la même livrée que le mâle, mais de couleur plus terne et une calotte brun roux



## Fauvette des jardins (*Sylvia borin*) ~ Phénotype ancestral ~

Taille du corps : 14cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	Dessus de la tête est joues gris brun. Sourcils assez indistinct. Menton et haut de la gorge gris beige clair
Cou, nuque	Gris brun
Dos	Gris brun uniforme
Poitrine, gorge	Gris beige uniforme plus foncé que le bec
Flancs	Gris beige comme le haut du poitrail
Ventre, région anale	Blanc sale
Ailes	Zone de l'épaule gris brun uniforme. Rémiges gris brun, plus foncées au centre et à l'extrémité
Croupion	Gris brun uni
Queue	Rectrices de couleur identique aux rémiges
Bec	Fin. Assez long et pointu. Gris, plus foncé à la pointe
Yeux	Noirs
Pattes, doigts	Gris brun
Ongles	Gris brun

**Remarques : pas de dimorphisme sexuel.**



## Fauvette grisette (*Sylvia communis*) ~ Phénotype ancestral ~

Taille du corps : 14cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	Mâle : Casque gris souris couvrant le crane jusqu'à la nuque et l'arrière de la joue. Menton et haut de la gorge blanc
Cou, nuque	Gris souris jusqu'au bas de la nuque
Dos	Gris beige uniforme
Poitrine, gorge	Menton et gorge de couleur blanche, bien délimité au poitrail Poitrail beige rosé
Flancs	Beige rosé comme le poitrail
Ventre, région anale	Blanc
Ailes	Épaules du même gris beige que le dos. Couvertures beige noirâtre, marquées de brun noir au centre. Grandes rémiges gris brun, plus foncé à l'extrémité. Rémiges secondaires beige roussâtre, comme les couvertures.
Croupion	Gris beige comme le dos
Queue	Rectrices externe blanches. Rectrices centrales gris brun foncé.
Bec	Fin, pointu. Gris, foncé à la pointe
Yeux	Noirs. Entourés d'un cercle oculaire gris blanchâtre
Pattes, doigts	Gris beige clair
Ongles	gris

**Remarques : la femelle porte la même livrée, avec des couleurs plus ternes. Le poitrail et les flancs sont gris beiges.**



## 7. Panurinae (Timaliidae) :

Ressemblent superficiellement aux « mésanges » à longue queue.

### *Panure à moustaches*

#### Panure à moustache (*Panurus biarmicus*)

~ Phénotype ancestral ~

Taille du corps : 16/17cm.

Tête ronde, massique, corps arrondi, longue queue effilée

Zones du plumage	Couleur
Tête	Mâle : Tête encapuchonnée de gris lumineux De chaque côté du bec, dessins vertical noir en forme de moustaches, englobant l'œil et s'étirant en pointe jusqu'au bas de la gorge. Menton et gorge blanc
Cou, nuque	Nuque et coté du cou gris comme la tête, nettement délimité de la couleur brun-roux du dos
Dos	Brun-roux nettement délimité par une ligne blanche qui part de l'épaule en suivant le contour de l'aile.
Poitrine, gorge	Gorge, poitrail et ventre blanc jusqu'à la zone anale
Flancs	Brun chamois, s'élargissant vers le ventre et en partie inférieure
Ventre, région anale	Blanc roussâtre
Ailes	Couvertures brun-roux, les plis proches de l'aile sont marqués de noir. Les quatre premières grandes rémiges sont blanches légèrement marquées de noir à la base et à la pointe. Les autres rémiges sont brun-roux, celles les plus proches du dos sont partiellement noires forment une ligne noire qui jouxte la ligne blanche du dos
Croupion	Brun noir
Queue	Rectrices brun-roux, les rectrices externes sont frangées de noir.
Bec	Jaune assez courbé, fin et pointu

Yeux	Cercle oculaire jaune. Centre noir
Pattes, doigts	noir
Ongles	noir

**Remarques : la femelle présente un patron de tête sans dessin et crème beige, joues crème grisâtre, le reste du plumage est identique à celui du mâle avec des couleurs plus ternes et la possibilité de traces noirâtre sur la tête et le bas du dos.**







## 8. Aegithalidae :

Petit oiseau au bec très court, longue queue étagée correspondant à plus de la moitié de la longueur totale.

### *Mésange à longue queue*

#### Mésange à longue queue (*aegithalos caudatus*)

#### ~ Phénotype ancestral ~

Taille du corps : 14 cm

Tête ronde et massive. Corps assez trapu. Longue queue effilée

Zones du plumage	Couleur
Tête	Entièrement blanche chez la forme d'Europe continental. certaines sous-espèces peuvent présenter un dessin temporal noir plus ou moins important
Cou, nuque	Blanc ou teinté de noir selon la sous-espèce
Dos	<ul style="list-style-type: none"><li>• Gris ardoise strié de blanc</li><li>• Les ailes sont délimitées par une bande rose carmin pâle, en forme de V qui va de l'épaule à la poitrine</li></ul>
Poitrine, gorge	blanc
Flancs	Blanc sur la partie inférieur, devenant grisâtre à la partie inférieure
Ventre, région anale	Partie supérieure du ventre blanc, se dégradant en gris teinté de rose sur la région anale
Ailes	<ul style="list-style-type: none"><li>• Couverture gris ardoise</li><li>• Grandes rémiges gris noir</li><li>• Rémiges secondaires gris foncé avec un liseré blanc</li></ul>
Croupion	Gris ardoise
Queue	<ul style="list-style-type: none"><li>• Queue étagée</li><li>• Couvertures externes blanches</li><li>• Rectrices centrales gris noir</li></ul>
Bec	Noir, court et pointu
Yeux	Noirs, cercle oculaire rose
Pattes, doigts	Gris noir
Ongles	noirs

Remarques : pas de dimorphisme sexuel apparent

## 9. Remizidae :

Allure de mésange, mais bec un peu plus long et fin. Oiseau actif et acrobate.

### *Mésange rémiz*

#### Mésange Rémiz (*Remiz pendulinus*) ~ Phénotype ancestral ~

Taille du corps : 11cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	<ul style="list-style-type: none"><li>• Crane, nuque et côtés du cou gris</li><li>• Masque noir formant une barre frontale qui couvre la zone loreale et s'étale sur la joue</li><li>• Menton blanc nettement délimité du poitrail</li></ul>
Cou, nuque	Gris uniforme
Dos	Brun roux
Poitrine, gorge	Zone pectorale écaillée de roux, se prolongeant sur les flancs
Flancs	Écaillage roux sur fond beige clair qui s'étend jusqu'à hauteur des cuisses
Ventre, région anale	Blanc crémeux
Ailes	<ul style="list-style-type: none"><li>• Petites couvertures brun roux</li><li>• Grandes couvertures rousses, brun noirâtre au centre et plus clair à l'extrémité, formant une fine barre alaire.</li><li>• Rémiges gris noirâtre à liseré clair</li></ul>
Croupion	Gris
Queue	Gris noirâtre
Bec	<ul style="list-style-type: none"><li>• Gris noir.</li><li>• fin et pointu</li></ul>
Yeux	Noirs
Pattes, doigts	Noirs
Ongles	noirs

**Remarques : la femelle porte la même livrée avec des teintes plus ternes. Il existe des sous-espèces dont le dessin de tête est différent.**



## 10. Paridae :

Petits oiseaux insectivores remuants, acrobates. Sexes semblables.

### Mésanges

#### Mésange huppée (*Parus cristatus*)

~ Phénotype ancestral ~

Taille du corps : 11/12cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dessus de la tête marqué d'un très fin écaillage noir blanc et formant une huppe érectile dirigée vers l'arrière du crâne.</li><li>• Fin sourcil blanc partant de la zone loreale et s'étirant sur les côtés de la tête.</li><li>• Joues grises, délimitées par un dessin noir en forme de V couché</li><li>• Zone blanche partant de la commissure et s'étirant vers le bas de la joue en demi collier.</li><li>• Menton noir qui se prolonge en fin collier qui délimite nettement la gorge et la nuque</li></ul>
Cou, nuque	Nuque gris voilé de brun uniforme
Dos	Gris voilé de brun uniforme
Poitrine, gorge	Poitrail blanc grisâtre
Flancs	Légèrement lavés de gris beige
Ventre, région anale	Blanc sale
Ailes	<ul style="list-style-type: none"><li>• Épaules gris voilé de brun</li><li>• Rémiges gris noirâtre avec liseré clair</li></ul>
Croupion	Gris
Queue	Gris noirâtre
Bec	Noir. Fin, court et pointu
Yeux	Noirs
Pattes, doigts	Noirs
Ongles	noirs

Remarques : pas de dimorphisme sexuel apparent.

## Mésange nonnette (*Parus palustris*) ~ Phénotype ancestral ~

Taille du corps : 12cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Calotte d'un noir brillant partant du front et couvrant la tête à hauteur de l'œil jusqu'au bas de la nuque.</li> <li>• Zone blanchâtre partant de la commissure et couvrant la joue, puis se dégradant en gris vers l'arrière.</li> <li>• Courte bavette noire couvrant le menton.</li> </ul>
Cou, nuque	Arrière du cou et nuque noires, prolongeant le casque
Dos	Gris voilé de beige
Poitrine, gorge	Bas de la gorge et haut du poitrail blanchâtre se dégradant en gris beige sur la zone pectorale et les flancs.
Flancs	Gris beige
Ventre, région anale	Blanc sale
Ailes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Couverture gris terne.</li> <li>• Rémiges noirâtre de couleur uniforme</li> </ul>
Croupion	Gris
Queue	Rectrices noirâtres comme les rémiges
Bec	Noir. Fin, court et pointu
Yeux	Noirs
Pattes, doigts	Gris noir
Ongles	noirs

**Remarques : pas de dimorphisme sexuel visible**

## Mésange boréale (*Parus montanus*) ~ Phénotype ancestral ~

Taille du corps : 12cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Calotte noire mat partant du front et couvrant la tête à hauteur de l'œil ainsi que la nuque</li> <li>• Commissure et joues blanches</li> <li>• Bavette noire couvrant le menton et la gorge (plus étendu que chez la mésange nonnette)</li> </ul>
Cou, nuque	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nuque noir mat.</li> <li>• Côtés du cou blanc</li> </ul>
Dos	Manteau gris à gris voilé de beige selon les sous-espèces.
Poitrine, gorge	Blanc grisâtre
Flancs	Gris à gris beige clair selon les sous-espèces
Ventre, région anale	Blanchâtre
Ailes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Épaule et couverture gris à gris beige</li> <li>• Rémiges gris foncé. Le vexille externe des rémiges secondaires et liseré de blanc, ce qui dessine une sorte de miroir alaire.</li> </ul>
Croupion	Gris foncé
Queue	Gris noirâtre
Bec	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Noir.</li> <li>• Fin, court et pointu.</li> </ul>
Yeux	Noirs
Pattes, doigts	Gris noir
Ongles	noir

**Remarques : pas de dimorphisme sexuel visible**

## Mésange noire (*Parus ater*) ~ Phénotype ancestral ~

Taille du corps : 11cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	<ul style="list-style-type: none"> <li>Casque noir couvrant le front et le crane jusqu'à hauteur de l'œil et s'étirant de chaque côté de la tête en forme de bande jusqu'à la nuque et délimitant une tache blanche couvrant l'arrière du crâne de l'occiput à la nuque.</li> <li>Joues et côtés du cou blanc.</li> </ul>
Cou, nuque	<ul style="list-style-type: none"> <li>Importante bavette noire couvrant le menton et la gorge</li> <li>Tache blanche couvrant l'arrière du crane</li> </ul>
Dos	Gris souris
Poitrine, gorge	Blanc grisâtre
Flancs	Voilés de chamois clair
Ventre, région anale	Chamois beige très délavé
Ailes	<ul style="list-style-type: none"> <li>Petites et grandes couvertures gris foncé bordées de blanc ce qui dessine une double barre claire.</li> <li>Rémiges grises, plus foncées à l'extrémité</li> </ul>
Croupion	Gris
Queue	Rectrices grises foncées
Bec	<ul style="list-style-type: none"> <li>Noir.</li> <li>Assez court, fin et pointu</li> </ul>
Yeux	Noirs
Pattes, doigts	Gris noirs
Ongles	noirs

**Remarques : pas de dimorphisme sexuel visible**



## Mésange charbonnière (*Parus major*) ~ Phénotype ancestral ~

**Taille du corps : 14cm.**

Forme assez ronde mais élégante. Tête bien proportionnée au corps. Pattes moyennement longues

Zones du plumage	Couleur
Tête	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Casque noir brillant, couvrant tout le crane selon une ligne horizontale à hauteur de l'œil, de la commissure à la nuque.</li> <li>• Joues entièrement blanche depuis la commissure du bec</li> <li>• Menton et gorge noir se prolongeant en dessin linéaire qui contourne la joue pour rejoindre le casque</li> </ul>
Cou, nuque	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nuque verdâtre éclairée de jaune</li> <li>• Coté du cou noir</li> </ul>
Dos	Verdâtre
Poitrine, gorge	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gorge noir dont le dessin se prolonge en une bande plus ou moins large (3-5mm) qui suit le poitrail et l'abdomen jusqu'à la zone anale</li> <li>• Poitrail jaune citron de part et d'autre de cette ligne</li> </ul>
Flancs	Jaune citron comme le poitrail avec reflet verdâtre en partie inférieure
Ventre, région anale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ventre jaune de part et d'autre de la bande noire</li> <li>• Région anale blanchâtre avec ligne médiane noire</li> </ul>
Ailes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Petite couvertures gris verdâtre</li> <li>• Couvertures noire frangées de blanc formant une barre alaire</li> <li>• Rémige gris noir avec liseré blanc étroit plus marqué près du dos</li> </ul>
Croupion	Gris foncé
Queue	Rectrice gris noir
Bec	Noir, fin pointu et assez court
Yeux	Noir
Pattes, doigts	Gris noir
Ongles	Noir

**Remarques : chez le mâle le dessin pectoral est plus important**



## Mésange azurée (*Parus cyanus*) ~ Phénotype ancestral ~

Taille du corps : 13 cm.

Corps trapu et arrondi tête ronde

Zones du plumage	Couleur
Tête	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bien arrondies</li> <li>• Blanche du front à l'occiput, marqué la forme de brides du casque de couleur gris bleu, couvrant la zone occipitale et s'infléchissant en pointe vers l'épaule, une ligne horizontale bleu noir s'étire jusqu'à l'œil</li> <li>• Zone loreale, joues et menton blanc, comme toute la face ventrale.</li> </ul>
Cou, nuque	partie dorsale de la nuque blanche
Dos	Bleu azur légèrement voilé de gris
Poitrine, gorge	Blanc avec une trace médiane noire à la partie inférieure
Flancs	Blanc
Ventre, région anale	Blanc
Ailes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Petites couvertures bleu incrustées de noir</li> <li>• Grandes couvertures blanches forment barre clair</li> <li>• Grandes rémiges bleu noir, marquées en leur centre d'un miroir blanc</li> <li>• Rémiges secondaires bleu voilées de gris</li> </ul>
Croupion	Bleu incrusté de noir
Queue	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rectrices assez longues</li> <li>• Bleu noir en face extérieure, blanchâtre en face intérieure</li> <li>• Les rectrices externes sont blanches</li> </ul>
Bec	Gris foncé, fin, court, et pointu
Yeux	Noir
Pattes, doigts	Gris foncé
Ongles	Noirs

**Remarques : pas dimorphisme sexuel apparent**

## Mésange bleue (*Parus caeruleus*)

### ~ Phénotype ancestral ~

**Taille du corps :** 11-12 cm

**Corps rond, silhouette trapue, front plat enchâssé directement dans les épaules**

Zones du plumage	Couleur
Tête	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Crane plat en zone frontale, bombé au sommet</li> <li>• Calotte bleu azur, délimité par une couronne blanche formant une bande centrale et contournant entièrement la tête</li> <li>• Trait loreal noir partant de la commissure se prolongeant à hauteur de l'œil pour entourer le crane</li> <li>• Joues blanches</li> <li>• Menton et gorge noir, qui se prolonge en contournant la joue pour rejoindre la bande noire de tête derrière l'œil</li> </ul>
Cou, nuque	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nuque gris vert surmonté d'une fine zone blanchâtre</li> </ul>
Dos	Gris vert
Poitrine, gorge	Jaune vif
Flancs	Jaune vif
Ventre, région anale	Jaune avec une bande médiane noire qui peut remonter plus ou moins vers le poitrail
Ailes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Petites couvertures gris vert</li> <li>• Grandes couvertures gris foncé voilé de bleu et bordé de blanc formant une barre alaire</li> <li>• Rémiges gris bleuté à liseré clair</li> <li>• Blanc aux rémiges secondaires</li> </ul>
Croupion	Verdâtre
Queue	Rectrices noir bleuté
Bec	Noir. Court et conique
Yeux	Noir, dans l'axe du bec
Pattes, doigts	Gris noir
Ongles	noir

**Remarques : pas dimorphisme sexuel apparent**



## 11. Sittidae :

Passereau trapu, queue courte, sexes généralement semblables. Très actives, les meilleurs oiseaux grimpeurs, se déplacent dans tous les sens sur les arbres. Se nourrissent d'invertébrés, graines, fruits secs et coincent les plus durs dans une fente pour les ouvrir à coup de bec.

### *Sittelle*

#### **Sittelle torchepot (*Sitta europea*) ~ Phénotype ancestral ~**

**Taille du corps : 14cm.**

**Corps rond et trapu. Tête massive et plate, sans encolure. Queue et pattes courtes**

Zones du plumage	Couleur
Tête	Très plate, enchâssée directement dans les épaules. Crane entièrement gris bleuté. Trait loreal noir partant de la commissure et s'étirant à hauteur de l'œil jusqu'à l'encolure. Joues et menton blanchâtre
Cou, nuque	Cou très peu marqué. Nuque gris bleuté
Dos	Gris bleuté
Poitrine, gorge	Gorge blanchâtre se dégradant en chamois clair sur le poitrail.
Flancs	De couleur rousse plus vive en partie inférieure
Ventre, région anale	Chamois clair
Ailes	Couvertures gris bleuté uni. Rémiges de même couleur gris noir au centre. Grandes rémiges gris noirâtre.
Croupion	Gris bleu
Queue	Très courte. Gris bleu
Bec	Noir à la pointe, plus clair aux commissures Robuste, long et pointu
Yeux	Noirs

Pattes, doigts	Gris brun
Ongles	Gris brun

**Remarques : pas de dimorphisme sexuel apparent**





## 12. Corvidae :

Grands passereaux souvent grégaires. Comportement très évolué. Ne chantent pas. Bec souvent robuste. Sexes semblable.

### Geai

#### Geai des chênes (*Garrulus glandarius*)

~ Phénotype ancestral ~

Taille du corps: 34 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	Gris beige strié noir sur le crane. Joues gris beige lavé de rose Moustache noire. Menton blanchâtre
Dos, gorge, poitrine	Dos gris beige. Poitrail beige lavé de rose
Flancs	Beige lavé de rose
Ailes	Epaule bleu strié noir. Aile noire avec miroir blanc
Croupion	Blanc. Ventre blanc
Queue	Noire
Yeux	Noirs. Cercle oculaire gris
Bec	Gris foncé
Pattes, doigt, ongles	Gris beige pâle



## Geai des chênes ~ Mutation opale ~

Taille du corps : 34 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	Gris argenté avec un voile clair de brun rose, strié de gris foncé et que l'oiseau peut relever en forme de huppe. Deux larges moustaches gris foncé.
Occiput	Brun clair avec un voile rose
Gorge	Blanc sale.
Dos	Manteau blanc argenté avec un voile gris clair.
Poitrine, flancs	Gris argenté avec un voile gris clair.
Ailes	Rémiges primaires gris clair avec les externes gris argenté. Rémiges secondaires gris clair avec les externes plus claires. Dessin caractéristique des ailes d'un bleu plus clair mais encore bien visible.
Croupion	Blanc.
Queue	Sus-caudales gris clair et sous-caudales gris foncé.
Yeux	Bleu clair, avec cercle oculaire gris foncé.
Bec	Gris foncé.
Pattes, doigts	Couleur chair foncé.
Ongles	Couleur corne clair.



# Pies

## Pie bavarde (*Pica pica*) ~ Phénotype ancestral ~

Taille du corps : 48 cm

Zone du plumage	Couleur
BEC	Noir avec des soies rictales noires.
YEUX	Noirâtres.
TETE COU DOS GORGE JAMBES HAUT de la POITRINE SUS et SOUS CAUDALE	Noir de jais brillant.
TETE SCAPULAIRES	Noir avec un reflet pourpre verdâtre.
BAS de la POITRINE VENTRE – FLANCS GRANDES SUS ALAIRES	Blanc.
AILES	Rémiges primaires et secondaires : noires avec un reflet métallique.
QUEUE	Rectrices : noires avec des reflets métalliques et longues. Les rectrices

**Remarque : les premières rémiges externes sont toujours graduellement plus courtes que les autres.**

Photo Philippe ROCHER



## Pie bavarde ~ Mutation brune ~

Taille du corps : 48 cm

Zone du plumage	Couleur
BEC	Brun avec des soies rectales brunes.
YEUX	brun.
TETE - COU - DOS GORGE - JAMBES HAUT de la POITRINE et SUS et SOUS CAUDALE	Brun.
SCAPULAIRES	brun.
BAS de la POITRINE VENTRE - FLANCS et GRANDES SUS ALAIRES	Blanc.
AILES	Rémiges primaires et secondaires : brun.
QUEUE	Rectrices : brunes

**Remarque : les premières rémiges externes sont toujours graduellement plus courtes que les autres.**



## Pie bleue (*Cyanopica cyanus*) ~ Phénotype ancestral ~

**Taille du corps** : 34 cm

Zone du plumage	Couleur
BEC	longueur (3 cm), noir, robuste avec la pointe du maxillaire supérieur légèrement courbée sur celle inférieure
YEUX	brun foncé, avec la pupille noire. Ligne circulaire foncée.
TETE ET FRONT	Casquette qui inclut l'œil de couleur noire
GORGE	Blanc sale
EPAULES	Gris perle.
FLANCS	De couleur gris bleu.
POITRIN VENTRE FLANCS	Gris clair avec une légère tonalité brunâtre.
AILES	courtes, de couleur bleuté avec une légère tonalité gris brunâtre sur les rémiges
QUEUE	Très longue, de couleur bleuté avec l'extrémité blanchâtre. Les rectrices externes sont courtes et augmentant de longueur jusqu'à la moitié de la suivante
PATTES ET DOIGTS	Noirs.
ONGLES	Noir.

**Remarque** : la femelle présente les mêmes couleurs que le mâle, mais en plus pâle et moins brillant.

### Défauts classiques :

- Casquette mal délimité
- Queue en repousse, désordonnée ou cassée
- Gorge couleur mal définie
- Bec dénudé avec un manque de plume tant sur la partie supérieure qu'inférieure
- Rémiges en repousse



# Corbeaux

## Corbeau freux (*Corvus frugilegus*) ~Phénotype ancestral~

Taille du corps : 48 cm

Zones du plumage	Couleur
BEC	Noir. Le bec est plus droit et plus effilé que chez la corneille noire. Il possède la base du bec décharnée (gris blanchâtre). La base du bec se dénude graduellement vers la deuxième année, donc, en plumage juvénile, le freux n'a pas la base du bec décharnée.
YEUX	Noir.
PLUMAGE du CORPS	Entièrement noir à reflets violacés.
AILES	Rémiges primaires et secondaires noires à reflets violacés.
QUEUE	Les rectrices sont noires et la forme de la que est arrondie.
PATTES et DOIGTS	Noir.
ONGLES	Noir.

**Pas de dimorphisme sexuel**

**Remarque** une caractéristique typique du freux est la culotte (plumage lâche aux cuisses N.B. ne pas punir.).

**Attention à la composition de l'aile des corvidés.**

1. La première rémige mesure la moitié de la longueur de la seconde.
2. La deuxième rémige mesure les trois quart de la longueur de la première
3. Les troisièmes et quatrièmes rémiges primaires sont les deux plus longues

Lors du jugement des corvidés, il faut tenir compte de cette caractéristique et ne jamais écrire : " rémige trop courte ou en repousse

**Photo S. Chartier**



# Corneille noire (*Corvus corone corone*)

## ~Phénotype ancestral~

Taille du corps : 47 cm

Zones du plumage	Couleur
BEC	Noir avec des soies rictales noires. Pointe de la mandibule supérieure plus ou moins courbée.
YEUX	Noir.
PLUMAGE du CORPS	Entièrement noir à reflets violacés.
GORGE	Les plumes de la gorge et des côtés du cou sont un peu allongées et pointues.
AILES	Les rémiges primaires et secondaires sont noires à reflets verdâtres.
QUEUE	Les rectrices sont noires et la forme de la queue est arrondie.
PATTES et DOIGTS	Noir.
ONGLES	Noir.

Pas dimorphisme sexuel :

### Défauts classiques

- \* Soies rictales abimées..
- \* Pas de lustre.





## Corneille mantelée (*Corvus corone cornix*) ~ Phénotype ancestral ~

Taille du corps : 47 cm

Zones du plumage	Couleur
BEC	Noir, recouvert des soies rictales noires
YEUX	Noir.
MANTEAU	Tête, cou, gorge et haut de la poitrine sont noirs avec un reflet métallique. Les autres parties : dos, ventre, flancs et croupion sont gris bleu.
GORGE	Les plumes de la gorge et du côté du cou sont effilées et pointues
AILES	Rémiges primaires, secondaires et couvertures sont noires.
QUEUE	Rectrices : noir. La forme de l'extrémité de la queue est arrondie.
PATTES et DOIGT	Noir
ONGLES	Noir

**Dimorphisme sexuel** : Il n'y a pas de dimorphisme marqué entre les deux sexes.

### défauts classiques

- Soies rictales abimées..
- Couvertures du manteau irrégulier
- Dessin des parties gris bleu irrégulier.



## Choucas des tours (*Corvus monedula*) ~ Phénotype ancestral ~

Taille du corps : 33 cm

Zone du plumage	Couleur
BEC	Noir avec des soies rictales noires
YEUX	Gris bleu avec la pupille noire.
COURONNE et FRONT	Noir à reflets bleutés.
NUQUE et JOUES	Gris argenté.
DOS	Noir avec des reflets bleutés.
MANTEAU CROUPION COUVERTURES et SUS CAUDALES	Noir avec des reflets métalliques.
GORGE MENTON VENTRE et FLANCS	Noir.
AILES	Noir avec un reflet bleuté.
QUEUE	Noir.
PATTES et DOIGTS	Noir.
ONGLES	Noir.

**Remarque : l'extrémité des ailes touche presque l'extrémité de la queue.**

**Les trois premières rémiges primaires sont graduellement plus courtes que les suivantes.**



Photo Philippe ROCHER



## Grand corbeau (*Corvus corax*) ~ Phénotype ancestral ~

Taille du corps : 64 cm

Zones du plumage	Couleur
BEC	Noir, recouvert des soies rictales noires
YEUX	Noir.
MANTEAU	Tête, cou, gorge et haut de la poitrine sont noirs avec un reflet métallique. Les autres parties : dos, ventre, flancs et croupion sont noirs.
GORGE	Les plumes de la gorge et du côté du cou sont effilées et pointues
AILES	Rémiges primaires, secondaires et couvertures sont noires.
QUEUE	Rectrices : noir. La forme de l'extrémité de la queue est arrondie.
PATTES et DOIGT	Noir
ONGLES	Noir

Dimorphisme sexuel : Il n'y a pas de dimorphisme marqué entre les sexes.

### Défauts classiques

- Soies rictales abimées.
- Couverture du manteau irrégulier



Détail du bec



## 13. Sturnidae :

Passereaux grégaires de taille moyenne. Plumage souvent noirâtre et irisé. Pattes plus ou moins courtes, bec robuste. Sexes semblables. Marchent à petits pas et courent.

### *Etourneau*

#### Etourneau sansonnet (*Sturnus vulgaris*)

~ Phénotype ancestral ~

Taille du corps : 21.5 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	Noir irisé pointillé blanc. Hiver : reflet brun
Dos	-idem-
Gorge, poitrine	-idem-
Flancs, ventre	-idem-
Ailes	Été : noir liseré brun. Hiver : reflet brun
Croupion	Été : noir pointillé blanc. Hiver : reflet brun
Queue	Été : noir liseré brun. Hiver : plus brun
Yeux	Brun foncé. Proches du bec
Bec	Été : jaune citron. hiver : gris foncé, base jaunâtre
Pattes, doigt, ongles	Été : rouge brun. Hiver : gris foncé

Photo Drizsmans



## Etourneau sansonnet ~ Mutation brun ~

Taille du corps : 21.5 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	Été : brun noirâtre pointillé blanc Hiver : voile brun
Dos, gorge, poitrine	idem
Flancs	idem
Ailes	Brun noirâtre liseré brun, plus visible en hiver
Croupion	Été : brun noirâtre pointillé blanc. Hiver :voile brun
Queue	Brun noirâtre liseré brun, plus visible en hiver
Yeux	Noirs
Bec	Été : jaunâtre. Hiver gris brun
Pattes, doigt, ongles	Gris brun

photo *Orizsmans*



## Etourneau sansonnet ~ Mutation agate ~

Taille du corps : 21.5 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	Gris foncé (bleuté) avec pointillés beiges.
Dos	Gris brun avec pointillés beiges.
Gorge	Blanc crème.
Flancs, poitrine	Gris foncé avec des dessins pointillés blancs.
Ailes	Brun grisâtre. Les extrémités des rémiges primaires sont plus foncées. Rémiges secondaires plus claires, avec le liseré brun clair.
Croupion	Gris foncé, liseré de gris beige.
Queue	Gris foncé, plumes bordées de gris beige.
Yeux	Brun foncé avec pupille jaune brun.
Bec	Gris clair à base jaune.
Pattes, doigt	Couleur chair.
Ongles	Couleur corne.



## Etourneau sansonnet ~ Mutation phaèò ~

Taille du corps : 21.5 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	Couleur de fond blanc crème avec un dessin d'écailles blanches, avec un liseré brun qui donne un aspect pointillé blanc et brun.
Dos, gorge, poitrine	Couleur de fond blanc crème avec un dessin d'écailles blanches, avec un liseré brun qui donne un aspect pointillé blanc et brun.
Flancs	Couleur de fond blanc crème avec un dessin d'écailles blanches, avec un liseré brun qui donne un aspect pointillé blanc et brun.
Ailes	Rémiges primaires blanches avec un léger liseré brun. Rémiges secondaires blanches avec un liseré brun plus large. Couvertures beige clair avec un large liseré brun.
Croupion	Beige clair avec des écailles de brunes.
Queue	Brun clair.
Yeux	Rouges.
Bec	Été : jaunâtre. Hiver : gris clair
Pattes, doigt, ongles	Couleur chair.




Photo Drizsmans

## Etourneau sansonnet ~ Mutation blanc ~

Taille du corps : 21.5 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	Blanc terne avec apparence de pointillés
Dos, gorge, poitrine	idem-
Flancs	idem-
Ailes	Blanc
Croupion	Blanc
Queue	Blanc
Yeux	Noir
Bec	Gris rosé
Pattes, doigt, ongles	Rose chair



## Etourneau sansonnet ~ Mutation pastel ~

Taille du corps : 21.5 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	Eté : gris argenté pointillé blanc Hiver : Voile beige
Dos, gorge, poitrine	-idem-
Flancs	-idem-
Ailes	Gris argenté léger liseré beige, plus visible l'hiver
Croupion	Eté : gris pointillé blanc. Hiver : voile beige
Queue	Gris argenté liseré beige, plus visible en hiver
Yeux	Noirs
Bec	Eté : jaune clair. Hiver : gris rosé.
Pattes, doigt, ongles	Gris clair



# Martin

## Martin roselin (*Sturnus roseus*) ~ Phénotype ancestral ~

Taille du corps : 21cm.

Zones du plumage	Couleur
Tête	Noir avec des reflets vert et pourpre. Les plumes du sommet de la tête sont longues et étroites et peuvent se relever en huppe
Cou, nuque	
Dos	De couleur rose plus pâle ou plus vive selon l'âge et la saison. Cette couleur se perd en captivité
Poitrine, gorge	Gorge : Noir avec des reflets vert et pourpre. De couleur rose plus pâle ou plus vive selon l'âge et la saison. Cette couleur se perd en captivité
Flancs	De couleur rose plus pâle ou plus vive selon l'âge et la saison. Cette couleur se perd en captivité
Ventre, région anale	
Ailes	Rémiges primaires : brunes, bordées à l'extérieur de noir violet Rémiges secondaires : sont noir vert du côté externe et brune du côté interne avec les trois dernières rémiges près du corps noir vert sur les deux côtés. Les couvertures : noires avec des reflets verts et pourpres.
Croupion	De couleur rose plus pâle ou plus vive selon l'âge et la saison
Queue	De couleur noire avec des reflets verts et violets
Bec	Noir et plombé de la base au milieu et de couleur chair ou rose du milieu à la pointe.
Yeux	Brun foncé.
Pattes, doigts	De couleur chair plus ou moins foncée
Ongles	De couleur noirâtre

***Remarques : La femelle ne diffère du mâle que par des couleurs moins brillantes et moins vive, une taille moins forte et une huppe plus courte***

## 14. Passeridae :

Plumage dépourvu de couleurs vives. Bec court, épais queue peu ou pas échancrée.

### *Niverolle*

#### **Niverolle (*Montifringilla nivalis*) ~ Phénotype ancestral ~**

Taille du corps : 17 cm

Zones du plumage	Couleur
BEC	Conique, assez robuste et pointu. Jaune à la base et noirâtre à la pointe. Le bec devient entièrement noir en été.
YEUX	Noir.
TETE	Calotte : crânienne. Nuque et joues : gris-ardoise. Lorums : gris-noirâtre. Bavette : noirâtre, plus distincte en été qu'en hiver. Couvrant le menton et arrondie à son contour inférieur. La bavette est séparée du gris de la tête par une ligne moustachale oblique de couleur gris clair, qui joint le dessin de la joue et se fond dans la couleur de la poitrine.
DOS	Brun foncé, tranchant nettement sur le gris foncé de la nuque. Le pourtour de chaque plume dorsale est plus clair que le centre, ce qui dessine un écaillage très régulier de la totalité du manteau.
POITRINE	Du même gris clair uni que la base des joues, allant en s'éclaircissant vers le ventre.
FLANCS	Gris uniforme comme la poitrine, plus clair au voisinage de la queue.
VENTRE	Blanc sale jusqu'à la partie anale.
AILES	Couvertures et rémiges secondaires : blanc sale, déterminant une large plage blanche sur l'aile. Les rémiges secondaires internes portent une marque brun foncé avec liseré plus clair. Rémiges primaires : noires sur les deux tiers de leur longueur terminale et blanches à leur base. Rémiges bâtardes : noires, ce qui dessine un très court miroir blanc. Les ailes sont assez longues et recouvrent la queue jusqu'au deux tiers.
CROUPION	Noirâtre.
QUEUE	Les deux rectrices centrales sont brunâtres chez les jeunes et noires chez les adultes. Toutes les autres sont blanches avec l'extrémité noire sur environ

	<b>1 cm.</b> <b>La queue est de longueur moyenne et légèrement échancrée.</b>
<b>PATTES et DOIGTS</b>	<b>Noir</b>
<b>ONGLES</b>	<b>Noir.</b>
<b>FORME GENERALE</b>	<b>Oiseau d'aspect robuste sans être lourd.</b>

**Dimorphisme sexuel** : Il n'y a pas de dimorphisme marqué entre les sexes.  
La bavette de la femelle n'est cependant que très légèrement marquée.

**défauts classiques des niverolles males et femelles**

- \* Manque de netteté dans l'écaillage dorsal.
- \* Bavette totalement absente (sujet en plumage juvénile avant 1ere mue,
- \* Dessin mal délimité.
- \* Ailes croisées ou pendantes.



# Moineaux

## Moineau soulcie (*Petronia petronia*) ~ Phénotype ancestral ~

Taille du corps : 14 cm

Zones du plumage	Couleur
BEC	Conique et robuste. Corne foncé à la mandibule supérieure, ocre jaune à la mandibule inférieure. La pointe de la mandibule supérieure est plus foncée.
YEUX	Brun foncé.
TETE	Plate, encolure large. Sommet du crâne gris beige clair, délimité de chaque côté par une bande longitudinale gris brun foncé qui s'étire vers la nuque. Les deux barres se rejoignent sur le front. Sourcils et moustaches : gris beige, très clair. Dessin des joues gris brun.
DOS	Couleur de fond gris beige, marqué d'un écaillage très net gris brun foncé.
GORGE	Gris beige clair, soulignée à la base par une tache oblongue jaune plus ou moins nette.
POITRINE	Gris beige, légèrement écaillé.
FLANCS	Gris beige, marqués d'un écaillage plus foncé.
VENTRE	Beige clair, zone anale marquée de brun.
AILES	Rémiges et couvertures primaires : brun noirâtre, liseré de beige. Rémiges secondaires externes sont marquées de beige très clair à leur extrémité. Couvertures secondaires : sont largement liserées de beige très clair.
CROUPION	Beige clair, strié de brun
QUEUE	Assez courte. Rectrices brun noirâtre, liserées de gris beige et bordées de blanchâtre à leur extrémité.
PATTES et DOIGTS	Brun foncé.
ONGLES	Gris noir.
FORME GENERALE	Robuste et trapu.

Défauts :

- 1) Manque de netteté dans le dessin,
- 2) Tache jaune de la gorge absente.



## Moineau espagnol (*Passer hispaniolensis*)

### ~ Phénotype ancestral ~

Taille du corps : 14.5 cm

Zones du plumage	Couleur
BEC	En hiver : brun grisâtre avec la racine jaunâtre. En été : noir Forme : conique et robuste.
YEUX	Noir.
TETE	Assez puissante et plate, encolure large. Large trait loreal noir, s'affinant en arrière de l'œil. Fin sourcil blanc. Front, sommet du crâne et nuque : entièrement brun roux. Le dessin de la nuque s'élargit à l'arrière de la joue. Joues : blanc lumineux, légèrement ombré de gris.
DOS	Entièrement écaillé de noir sur fond gris beige clair.
GORGE	Entièrement noir uniforme.
POITRINE	Noir uni, se dégradant en écaillage noir à la base L'étendue du noir de la poitrine est variable
FLANCS	Entièrement marqués de larges écailles noires sur fond gris blanc.
VENTRE	Blanchâtre.
AILES	Rémiges primaires : gris noir, liserées de brun Le liseré des rémiges secondaires est plus large.. Les couvertures sont roussâtres, liserées de blanc Le liseré des couvertures primaires <u>est plus large et</u> forme une bande alaire.
CROUPION	Gris foncé
QUEUE	Rectrices gris noir, bordées de noir.
PATTES et DOIGTS	Gris brun foncé.
ONGLES	Gris noir.
FORME GENERALE	Un peu plus élancé que le moineau domestique. Robuste et élégant.

Dimorphisme sexuel : La femelle ressemble à celle du moineau domestique avec un écaillage plus net et plus foncé sur le dos. Les stries des flancs et le trait loreal sont plus marqués.

# Moineau cisalpin (*Passer italiae*)

## ~ Phénotype ancestral ~

*Remarques : La femelle est semblable à celle du moineau domestique.*

Taille du corps : 14.5cm. Robuste et élégante

Zones du plumage	Couleur
Tête	Robuste, crâne assez plat Zone loreale noire, surmontée d'un fin sourcil blanc Front, calotte crânienne et nuque : entièrement brun roux. Joues : blanchâtres.
Cou, nuque	
Dos	Brun, fortement strié de noir
Poitrine, gorge	Poitrine : Partie supérieure noire s'estompant vers le bas, la base de la poitrine est gris blanchâtre Gorge : Large bavette noire couvrant toute la gorge, la bavette est moins intense en hiver
Flancs	Gris blanchâtre.
Ventre, région anale	Gris blanchâtre.
Ailes	Rémiges primaires : brun noir, liserées de roussâtre sur le vexelle externe. Rémiges secondaires : plus rousses. Couvertures primaires : brun noir avec large liseré roussâtre. Couvertures secondaires : noirâtres, très largement bordées de blanc qui forme une nette bande alaire. Epaules : roussâtre.
Croupion	Gris beige.
Queue	Rectrices brun noir, liserées de brun grisâtre
Bec	Brun noirâtre, plus foncé en été Conique et robuste.
Yeux	noirs
Pattes, doigts	Gris brun
Ongles	De couleur foncée.

Défauts :

- 1) Ligne oculaire pas assez nette,
- 2) Stries dorsales irrégulières,
- 3) Barre alaire irrégulières,
- 5) Bavette irrégulière ou trop flou chez le mâle.

## Moineau domestique mâle (*Passer domesticus*)

### ~ Phénotype ancestral ~


Taille du corps : 14.5 cm

Zones du plumage	Couleur
Lorums, région sous l'œil	Noirs. A partir de l'œil, existence d'une raie brun marron qui va en s'élargissant vers la nuque. Petit point blanc derrière l'œil.
Front, couronne, nuque	Gris.
Joues, régions parotiques	Gris blanchâtre.
Gorge, menton, milieu du haut de la poitrine	Eté : noirs. Hiver : noir grisâtre avec un dessin pas aussi net qu'en été. Reste de la poitrine blanchâtre.
Epaules	Scapulaires brunes rayées de noir avec le bord blanc grisâtre formant un dessin sur les épaules.
Dos	Manteau brun marron strié de noir. Bas du dos blanc grisâtre.
Flancs	Blanc grisâtre nuancés d'une teinte isabelle.
Rémiges	Primaires brun noir avec liseré roussâtre le long du vexille externe.
Couvertures	Petites marron vif. Moyennes brun noir terminées par un bord blanchâtre formant une bande alaire. Grandes brun noir avec large bord externe roux et terminées par un bord blanchâtre.
Croupion	Gris brunâtre.
Queue	Rectrices brun noir avec liseré externe grisâtre. Sous-caudales roussâtres.
Yeux	Brun foncé.
Bec	Brun grisâtre avec la racine jaunâtre en hiver, noire en été.
Pattes, doigts	Brun clair.
Ongles	Noirs.

Défauts :

- 1) Lignes oculaires pas assez nettes surtout chez les femelles,
- 2) Bavette et dessin de la poitrine irréguliers,
- 3) Flancs trop clairs par rapport à la poitrine,
- 4) Barres alaires irrégulières,
- 5) Dessin du dos irrégulier.

Photo UOF P. Malburget



## Moineau domestique femelle (*Passer domesticus*) ~ Phénotype ancestral ~

Taille du corps : 14.5 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	Brun avec des traits sourciliers brun jaune de la base du bec à la région parotique.
Gorge, poitrine	Gris brun. Pas de bavette ni de plastron noirs.
Epaules, ventre	Gris brun.
Dos	Brun dominant avec des stries noir brun.
Flancs	Gris brun, un peu plus foncé que la poitrine.
Ailes	Comme le mâle mais les bords des rémiges sont d'un brun plus pâle. Bande alaire typique.
Croupion	Brun.
Queue	Comme le mâle mais les bords des rectrices sont d'un brun plus pâle.
Yeux	Brun foncé.
Bec	Couleur corne.
Pattes, doigts	Brun clair.
Ongles	Noirs.



## Moineau domestique mâle ~ Mutation brun ~

Taille du corps : 14.5 cm


Zones du plumage	Couleur
Lorums	Brun foncé. Trait brun rougeâtre de derrière les yeux vers la nuque en s'élargissant. Petit point blanc derrière les yeux.
Front, couronne, nuque, croupion	Brun beige.
Joues, régions parotiques	Crème.
Gorge, menton, milieu du haut de la poitrine	Été : bavette brun foncé. Hiver : brun foncé avec un dessin pas aussi net qu'en été. Reste de la poitrine crème foncé.
Epaules	Scapulaires brun rouge rayées de brun rouge foncé avec le bord brun clair.
Dos	Manteau brun chaud avec des reflets bruns rougeâtre strié de brun très foncé.
Flancs	Crème foncé.
Rémiges	Primaires brun foncé avec liseré brun clair le long du vexille externe.
Couvertures	Petites brun rougeâtre. Moyennes brun foncé avec un liseré brun clair. Grandes brun foncé avec bord brun rougeâtre et terminées par un bord brun clair. Une autre bande alaire blanchâtre existe entre les moyennes et les grandes couvertures.
Queue	Rectrices brun chaud avec liseré externe brun clair.
Yeux	Brun foncé.
Bec	Couleur chair teinté de jaune à la base du bec en hiver, brunâtre en été.
Pattes, doigts	Couleur chair teinté de jaunâtre.
Ongles	Couleur chair.



## Moineau domestique femelle ~ Mutation brun ~

Taille du corps : 14.5 cm

Zones du plumage	Couleur
Front, couronne, nuque	Brun chaud.
Traits sourciliers, lorums	Couleur crème.
Joues	Brun clair.
Gorge, poitrine, ventre, flancs	Brun jaunâtre chaud. Couleur bien régulière.
Dos	Brun chaud strié de brun foncé.
Rémiges	Brun foncé avec les liserés plus clairs.
Couvertures	La barre alaire entre les couvertures moyennes et les grandes couvertures est crème clair. l'extrémité des grandes couvertures forme une barre alaire brun clair.
Croupion	Brun chaud.
Queue	Brun chaud.
Yeux	Brun foncé.
Bec	Couleur chair teinté de jaune à la base.
Pattes, doigts	Couleur chair.
Ongles	Couleur chair foncé.



## Moineau domestique mâle ~ Mutation « phaéo » ~

**Taille du corps** : 14.5 cm

Hérédité : la dénomination « Phaéo » concerne actuellement des caractères héréditaires différents sous un aspect identique. Etude en cours pour déterminer des appellations distinctes

Zones du plumage	Couleur
Lorums	Brun clair.
Front, couronne, nuque	Beige clair.
Traits oculaires	Brun marron à partir de l'œil en s'élargissant vers la nuque.
Joues, région parotique	Blanc sale avec léger voile brun.
Gorge	Dessin typique brun clair.
Poitrine, ventre	Blanc sale.
Dos	Blanc sale avec dessin phaéo (liseré brun) sur tout le dos.
Flancs	Blanc sale avec voile brun clair.
Rémiges, rectrices	Blanc sale avec liseré brun marron.
Couvertures	Petites brun marron. Grandes et moyennes blanc sale avec liseré brun marron. Bande alaire blanc sale entre les moyennes et les grandes couvertures.
Croupion	Beige clair avec un liseré brun marron.
Yeux	Brun foncé
Bec	Couleur chair. Parfois une flamme foncée à la base du bec.
Pattes, doigts, ongles	Couleur chair.



## Moineau domestique femelle ~ Mutation « phaéo » ~

**Taille du corps** : 14.5 cm  
caractères héréditaires différents sous un aspect identique. Etude en cours pour déterminer des appellations distinctes

Hérédité : la dénomination « Phaéo » concerne actuellement des

Zones du plumage	Couleur
Front, vertex, occiput	Blanc sale avec voile brun.
Traits sourciliers, nuque, lorums, joues, régions parotiques	Brun chaud.
Gorge, poitrine, flancs	Brun clair.
Ventre	Brun clair mais plus clair que la poitrine.
Dos	Blanc sale avec dessin phaéo brun très prononcé.
Ailes	Même description que le mâle, mais les liserés sont brun chaud.
Croupion	Brun chaud avec liseré plus foncé.
Queue	Blanc sale avec liseré brun chaud sur toutes les rectrices.
Yeux	Brun foncé.
Bec	Couleur chair. Peut montrer une flamme foncée à la base du bec.
Pattes, doigts, ongles	Couleur chair.





photo Drizsmans

## Moineau domestique mâle ~ Mutation agate ~

Taille du corps : 14.5 cm

Zones du plumage	Couleur
Lorums	Noirs.
Front, couronne, nuque	Gris brun léger.
Traits oculaires	Brun rouge. Petits points blancs derrière les yeux.
Joues	Gris beige.
Gorge	Bavette typique noire.
Poitrine, ventre, flancs	Gris beige.
Dos	Brun beige strié de brun noir.
Rémiges	Beiges avec un léger liseré brun noisette.
Couvertures	Petites brun noisette. Moyennes beiges avec les extrémités blanchâtres formant une bande alaire. Grandes brun beige avec un liseré beige clair.
Queue	Beiges avec liseré brun beige clair.
Croupion	Beige.
Yeux	Brun foncé.
Bec	Noir en été et chair foncé à base jaunâtre en hiver.
Pattes, doigts, ongles	Couleur chair.



## Moineau domestique femelle ~ Mutation agate ~

Taille du corps : 14.5 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	Gris brun foncé avec les traits sourciliers brun beige clair.
Gorge, poitrine	Beige clair avec une teinte ivoire.
Ventre, flancs	Beige clair avec une teinte ivoire.
Dos	Brun beige strié de noir.
Rémiges	Beiges.
Couvertures	Petites brun clair. Moyennes brun foncé terminées par un bord blanc sale formant une bande alaire. Grandes brun foncé avec un liseré beige clair.
Croupion	Beige.
Queue	Rectrices beiges avec liseré beige clair.
Yeux	Brun noir.
Bec	Couleur chair à base jaune.
Pattes, doigts, ongles	Couleur chair.



## Moineau domestique mâle ~ Mutation opale ~

Taille du corps : 14.5cm

Zones du plumage	Couleur
Lorums	Gris bleu.
Front, couronne, nuque	Gris argenté.
Traits oculaires	Gris bleu montrant encore un rien de brun noisette.
Joues	
Gorge	Gris argenté avec le dessin gris bleu typique de l'opale.
Poitrine, ventre	Gris argenté.
Dos	Gris argenté strié de gris bleu.
Ailes	Gris argenté strié de gris bleu. Un léger voile brun noisette est encore visible dans les liserés.
Queue	Gris argenté avec liserés gris bleu.
Croupion	Gris argenté.
Yeux	Noirs.
Bec	Chair foncé en hiver et noir bleuté en été.
Pattes, doigts, ongles	Couleur chair foncé.



## Moineau domestique femelle ~ Mutation opale ~

Taille du corps : 14.5 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	Gris bleu.
Traits sourciliers	Gris clair avec une teinte beige.
Lorums	Gris bleu foncé.
Gorge, poitrine, ventre	Gris argenté.
Dos	Gris argenté strié de gris bleu.
Rémiges	Gris bleu clair avec un liseré beige clair sur les couvertures laissant encore voir les caractéristiques typiques des dessins de l'aile.
Croupion	Gris argenté.
Queue	Gris argenté.
Yeux	Noirs.
Bec	Chair foncé en hiver et noir grisâtre en été.
Pattes, doigts, ongles	Couleur chair foncé.

Photo KDOF



## Moineau domestique mâle ~ Mutation brun pastel ~

Taille du corps : 14.5 cm

Zones du plumage	Couleur
Couronne	Beige foncé.
Traits oculaires	Bruns.
Joues	Couleur crème.
Gorge	Bavette brun beige.
Poitrine, ventre, flancs	Beiges.
Dos	Brun clair.
Rémiges	Primaires beiges et secondaires claires avec un liseré beige long du vexille externe.
Couvertures	Petites brun clair. Moyennes brun clair avec une bande alaire beige clair. Grandes brun clair. Scapulaires brun clair.
Queue	Rectrices beiges avec un liseré clair le long du vexille externe.
Croupion	Couleur crème.
Yeux	Brun foncé.
Bec	Couleur chair avec la racine jaunâtre.
Pattes, doigts	Couleur chair
Ongles	Couleur corne.

Photo Jean-Luc Berbudeau



Photo UOF p. Malburgt



## Moineau domestique femelle ~ Mutation brun pastel ~

Taille du corps : 14.5 cm


Zones du plumage	Couleur
Tête	Couleur crème avec les traits sourciliers visibles.
Joues	Crème beige.
Gorge, poitrine	Crèmes dans l'ensemble.
Ventre, flancs	Crèmes dans l'ensemble.
Dos	Crème beige.
Rémiges	Couleur crème beige avec un liseré clair le long du vexille externe.
Couvertures, scapulaires	Crème beige.
Croupion	Crème.
Queue	Crème beige avec un liseré clair le long du vexille externe.
Yeux	Brun foncé.
Bec	Couleur chair avec la racine jaunâtre.
Pattes, doigts,	Couleur chair.
Ongles	Couleur corne.



## Moineau domestique ~ Mutation ino (ex-albino) ~

Taille du corps : 14.5 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	Blanche légèrement teintée de jaune.
Gorge, poitrine	Blanche légèrement teintée de jaune.
Ventre, flancs	Blanche légèrement teintée de jaune.
Dos	Blanche légèrement teintée de jaune.
Ailes	Blanche légèrement teintée de jaune.
Croupion	Blanche légèrement teintée de jaune.
Queue	Blanche légèrement teintée de jaune.
Yeux	Rouges.
Bec	Couleur chair.
Pattes, doigts,	Couleur chair.
Ongles	Couleur chair.



## Moineau domestique ~ Mutation blanc ~

Taille du corps : 14.5 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	Blanche.
Gorge, poitrine	Blanches.
Ventre, flancs	Blancs.
Dos	Blanc.
Ailes	Blanches.
Croupion	Blanc.
Queue	Blanche.
Yeux	Noirs.
Bec	Couleur chair.
Pattes, doigts,	Couleur chair.
Ongles	Couleur chair.

## Moineau domestique ~ Mutation mâle satiné ~

Taille du corps : 14.5 cm

Zones du plumage	Couleur
Couronne	Blanc sale.
Traits oculaires	Brun rouge clair.
Joues	Couleur ivoire.
Gorge	Bavette brun clair.
Poitrine, ventre, flancs	Couleur chair.
Dos	Couleur de fond ivoire avec un dessin dorsal brun beige clair bien visible.
Rémiges	Couleur ivoire.
Couvertures	Petites brun beige clair. Moyennes blanches, formant une bande alaire. Grandes couleur ivoire.
Queue	Couleur ivoire.
Croupion	Couleur ivoire.
Yeux	Rouges.
Bec	Couleur chair.
Pattes, doigts	Couleur chair.
Ongles	Couleur chair.



## Moineau domestique ~ Mutation femelle satiné ~

Taille du corps : 14.5 cm

Zones du plumage	Couleur
Couronne	Couleur ivoire légèrement striée.
Traits oculaires	Couleur ivoire.
Joues	Couleur ivoire.
Gorge	Couleur chair.
Poitrine, ventre, flancs	Couleur chair.
Dos	Couleur de fond ivoire avec un dessin dorsal beige clair bien visible.
Rémiges	Couleur ivoire.
Couvertures	Petites brun beige clair. Moyennes blanches, formant une bande alaire. Grandes couleur ivoire.
Queue	Couleur ivoire.
Croupion	Couleur ivoire.
Yeux	Rouges.
Bec	Couleur chair.
Pattes, doigts	Couleur chair.
Ongles	Couleur chair.

## Moineau friquet (*Passer montanus*) ~ Phénotype ancestral ~

Taille du corps : 13.5 - 14 cm

Zones du plumage	Couleur
Dessus de la tête, nuque	Brun chocolat.
Côtés de la tête et du cou	Blancs avec tache noire sur les joues.
Lorums, trait sous l'œil, menton	Noirs.
Epaules	Brunes.
Poitrine	Haut grisâtre et bas blanchâtre.
Flancs, sous-caudales	Bruns.
Dos	Haut du dos brun rayé de noir. Bas du dos gris brun.
Rémiges	Primaires et secondaires brun noir liserées de roux.
Couvertures	Grandes noires avec bord brun jaunâtre le long du vexille externe et le bout blanchâtre. Moyennes noires avec la pointe blanchâtre. Petites roux marron.
Queue	Rectrices brun foncé liserées de brun jaunâtre.
Croupion	Brun gris.
Yeux	Brun foncé.
Bec	Noir et été et brun foncé avec la base de la mandibule inférieure jaunâtre en hiver
Pattes, doigts	Couleur corne.
Ongles	Noirs.

Dimorphisme sexuel : aucun.



## Moineau friquet ~ Mutation opale ~

Taille du corps : 13.5 - 14 cm

Zones du plumage	Couleur
Front, couronne, nuque	Gris bleu.
Joues	Gris argenté avec une tache gris bleu.
Gorge	Gris argenté avec bavette gris bleu.
Poitrine	Gris argenté.
Ventre	Blanc sale.
Flancs	Gris argenté.
Dos	Gris argenté strié de gris bleu.
Rémiges	Gris argenté.
Couvertures	Petites gris bleu. Moyennes gris argenté avec extrémité blanche formant une bande alaire. Grandes gris argenté.
Queue	Gris argenté.
Croupion	Gris argenté.
Yeux	Brun noir.
Bec	Gris bleu avec du jaune à la base.
Pattes, doigts	Couleur chair foncé.
Ongles	Couleur chair foncé.

**Dimorphisme sexuel** : aucun.

photo Driessmans

Défauts des moineaux friquets :

- 1) Taches des joues irrégulières,
- 2) Barres alaires irrégulières,
- 3) Dessin de la calotte pas net dans la nuque,
- 4) Menton et bavette irréguliers,
- 5) Dessin dorsal irrégulier,
- 6) Couleur des flancs pas identique à celle de la poitrine.




## Moineau friquet ~ Mutation brun ~

**Taille du corps** : 13.5 - 14 cm

Zones du plumage	Couleur
Front, couronne, nuque	Brun noisette clair.
Joues	Blanches avec une tache brun foncé au milieu.
Lorums	Brun foncé.
Gorge	Blanche avec bavette brun foncé.
Poitrine	Couleur isabelle.
Ventre	Blanc.
Flancs, croupion	Brun jaune chaud.
Dos	Brun jaune chaud, strié de brun foncé.
Rémiges	Brun jaune.
Couvertures	Petites brun noisette clair. Moyennes brun jaune chaud avec bord blanc à l'extrémité (ceci formant une bande alaire). Grandes brun jaune avec un liseré isabelle.
Queue	Brun jaune chaud.
Yeux	Brun foncé.
Bec	Brun et jaune à la base.
Pattes, doigts	Couleur chair.
Ongles	Couleur chair.

**Dimorphisme sexuel** : aucun.



## Moineau friquet ~ Mutation brun opale ~

Taille du corps 13.5 - 14 cm

Zones du plumage	Couleur
Front, vertex, occiput	Brun beige.
Joues	Gris blanc avec tache brun beige au milieu.
Gorge	Gris blanc avec bavette brun beige.
Poitrine	Gris blanc avec un léger voile beige clair.
Ventre	Gris blanc avec un léger voile beige clair.
Flancs	Gris blanc avec un léger voile beige clair.
Dos	Manteau gris, strié de brun beige.
Rémiges	Grandes gris blanc avec un liseré beige. Secondaires gris blanc avec un liseré brun beige.
Couvertures	Petites brun beige. Moyennes et grandes gris blanc avec un liseré brun beige.
Croupion	Brun beige.
Queue	Rectrices gris blanc légèrement voilé de beige.
Yeux	Brun noir.
Bec	Brun foncé.
Pattes, doigts	Couleur chair.
Ongles	Couleur chair.

**Dimorphisme sexuel** : aucun.



## 15. Fringillidae :


Petits passereaux plus ou moins grégaires après la reproduction. Bec robuste de granivore. Chant souvent plus mélodieux que celui des bruants.

### *Pinsons*


## Pinson des arbres

(*Fringilla coelebs*)

Mâle



Femelle



Défauts :

- 1) Dessin des joues irrégulier,
- 2) Barres alaires irrégulières ou incomplètes,
- 3) Miroir pas visible ou pas symétrique,
- 4) Flancs trop clair,
- 5) Couleur de la poitrine irrégulière.

## Pinson des arbres mâle (*Fringilla coelebs*) ~ Phénotype ancestral ~

Taille du corps : 14 cm

Zones du plumage	Couleur
Front	Noir.
Couronne, occiput, nuque	Gris bleuté.
Joues, lorums, menton, sourcils, région auriculaires, gorge, poitrine, flancs	Passant du rose brun ou rouge brun.
Dos	Brun marron.
Epaules	Gris bleuté.
Ventre	Région anale blanche.
Rémiges	Primaires brun noir. Secondaires brun noir avec un liseré jaunâtre à la partie inférieure des rémiges. Sus-alaires et barre alaire blanches avec petit miroir blanc.
Croupion	Vert olive teinté de jaune.
Queue	Rectrices brun noirâtre étroitement liserées de vert le long du vexille externe. Rectrices externes avec grande tache blanche à leur partie inférieure.
Yeux	Brun foncé.
Bec	Bleu acier en été, brun gris avec l'extrémité plus foncée en hiver.
Pattes, doigts	Brun clair.
Ongles	Noirâtres.



Photo Philippe ROCHER

## Pinson des arbres femelle (*Fringilla coelebs*) ~ Phénotype ancestral ~

Taille du corps : 14 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête, dos, poitrine	Gris brun.
Gorge	Gris brun sans taches plus claires.
Epaules	Brun beige.
Flancs	Gris brun sans être délavés.
Ventre	Région anale blanc sale.
Rémiges	Comme le mâle mais plus brunes. La barre alaire est aussi moins blanche.
Croupion	Vert lavé de jaunâtre.
Queue	Comme le mâle mais plus brune.
Yeux	Brun foncé.
Bec	Gris brun.
Pattes, doigts	Brun clair.
Ongles	Noirâtres.



## Pinson des arbres mâle (*Fringilla coelebs*)

### ~ Mutation brun ~

Taille du corps : 14 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	Brun avec la bande frontale plus foncée.
Gorge, poitrine	Brun avec un voile lie de vin.
Dos	Brun.
Flancs	Bruns avec un voile lie de vin.
Ventre	Brun clair.
Rémiges	Rémiges primaires brunes avec un miroir blanc. Rémiges secondaires brunes.
Couvertures	Grandes couvertures brunes avec une barre alaire crème. Couvertures moyennes brunes avec barre scapulaire blanche. Petites couvertures brunes.
Croupion	Brun.
Queue	Brun avec dessin blanc sous la queue.
Yeux	Brun foncé.
Bec	Brun clair.
Pattes, doigts	Couleur chair.
Ongles	Couleur chair.



## Pinson des arbres femelle (*Fringilla coelebs*)

### ~ Mutation brun ~

Taille du corps : 14 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête, dos, poitrine	Brun chaud.
Gorge	Brun chaud.
Flancs	Brun chaud.
Ventre	Région anale blanc crème.
Rémiges	Rémiges primaires brun chaud avec un miroir blanc. Rémiges secondaires brun chaud.
Couvertures	Grandes couvertures brun chaud avec un miroir blanc. Couvertures moyennes brun chaud avec barre scapulaire blanche. Petites couvertures brun chaud.
Croupion	Brun chaud.
Queue	Brun chaud avec dessin blanc sous la queue.
Yeux	Brun foncé.
Bec	Brun clair.
Pattes, doigts	Couleur chair.
Ongles	Couleur chair.



## Pinson des arbres mâle (*Fringilla coelebs*)

### ~ Mutation agate ~

Taille du corps : 14 cm

Zones du plumage	Couleur
Front	Noir.
Couronne, occiput, nuque	Gris bleuté.
Joues, lorums, menton, sourcils, région auriculaires, gorge, poitrine, flancs	Rose brun.
Dos	Gris brunâtre.
Ventre	Région anale blanche.
Ailes	Rémiges primaires noires. Rémiges secondaires noires avec un liseré jaunâtre à leur partie inférieure. Sus- alaires (épaules) blanches. Barre alaire blanche et petit miroir blanc.
Croupion	Vert olive teinté de jaune.
Queue	Rectrices noires étroitement liserées de vert le long du vexille externe. Les rectrices externes portent une grande tache blanche à leur partie inférieure.
Yeux	Brun foncé.
Bec	Bleu acier en été, gris avec l'extrémité plus foncée en hiver.
Pattes, doigts	Couleur chair.
Ongles	Foncés.



## Pinson des arbres femelle (*Fringilla coelebs*)

### ~ Mutation agate ~

Taille du corps : 14 cm


Zones du plumage	Couleur
Tête, dos	Gris brun clair, avec deux raies gris foncé sur le vertex et descendant dans la nuque.
Gorge, poitrine	Gris clair.
Dos, épaules	Gris brun clair.
Flancs	Gris brun clair.
Ventre	Région anale gris blanc sale.
Ailes	Rémiges primaires noires. Rémiges secondaires noires avec un liseré jaunâtre à leur partie inférieure. Sus- alaires (épaules) blanches. Barre alaire moins blanche que chez le mâle et petit miroir blanc.
Croupion	Vert lavé de jaunâtre.
Queue	Rectrices noires étroitement liserées de vert le long du vexille externe. Les rectrices externes portent une grande tache blanche à leur partie inférieure.
Yeux	Brun foncé.
Bec	Brun clair légèrement flammé de gris.
Pattes, doigts	Couleur chair.
Ongles	Foncés.



## Pinson des arbres mâle (*Fringilla coelebs*) ~ Mutation opale ~

Taille du corps : 14 cm

Zones du plumage	Couleur
Front	Noir.
Couronne, occiput, nuque	Gris foncé bleuté.
Joues, lorums, menton, sourcils, région auriculaires	Couleur jaunâtre, voilée de chamois
Epaules	Gris foncé bleuté.
Gorge, poitrine, flancs	Couleur lie de vin très clair avec un voile gris clair bleuté.
Dos, croupion	Jaune verdâtre. Dos avec des reflets bleutés.
Ventre	Région anale sale blanc.
Ailes	Rémiges primaires gris bleu. Rémiges secondaires gris bleu avec un liseré jaunâtre à leur partie inférieure. Sus-alaires (épaules) blanches. Barre alaire jaune verdâtre et petit miroir blanc.
Queue	Rectrices gris bleuté étroitement liserées de jaune verdâtre le long du vexille externe. Les rectrices externes portent une grande tache blanche à leur partie inférieure.
Yeux	Brun foncé.
Bec	Gris foncé bleuté en été, gris foncé en hiver.
Pattes, doigts	Couleur chair foncé.
Ongles	Foncés.



## Pinson des arbres femelle (*Fringilla coelebs*)

### ~ Mutation opale ~

Taille du corps : 14 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	Gris clair bleuté avec deux raies plus foncées sur le vertex et descendant dans la nuque.
Dos	Jaune verdâtre avec un voile bleuté
Epaules	Gris clair bleuté.
Gorge, poitrine, flancs	Gris clair lavé de jaunâtre.
Ventre	Région anale gris blanc sale.
Ailes	Comme la mâle mais d'un gris bleuté plus clair.
Croupion	Jaune verdâtre.
Queue	Comme la mâle mais d'un gris bleuté plus clair.
Yeux	Brun foncé.
Bec	Couleur chair foncé légèrement flammé de gris.
Pattes, doigts	Couleur chair foncé.
Ongles	Foncés.



Photo UOF P. Malburçt

## Pinson des arbres (*Fringilla coelebs*)

### ~ Mutation brun opale ~

Taille du corps : 14 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête, Dos, Epaules Gorge, poitrine, flancs Ventre. Ailes, Croupion Queue, Yeux	Le plumage est presque totalement dépourvu de pigmentation en eumélanine. Il subsiste un léger voile de phaéomélanine sur le dos, les rémiges et les rectrices. Le dos et le poitrail et le croupion sont jaune crème chez le mâle, beige très clair chez la femelle Brun
Pattes, doigts	Couleur chair
Ongles	-idem-



# Pinson du Nord

~ *Fringilla montifringilla* ~

Mâle plumage hivernale



Défauts :

- 1) Cercle oculaire irrégulier,
- 2) Taches claires entre le bec et les yeux (lorum),
- 3) Couleur de la poitrine délavée,
- 4) Pattes bicolores,
- 5) Taches blanches ou noires sur le menton,
- 6) Spots trop groupés sur les flancs,
- 7) Ligne de séparation de la poitrine irrégulière,
- 8) Miroirs des ailes absents ou trop peu visibles,
- 9) Stries brunâtre de la tête de la femelle irrégulières.



Plumage nuptial

## Pinson du nord mâle (*Fringilla montifringilla*)

### ~ Phénotype ancestral ~

Taille du corps : 14 cm

Zones du plumage	Couleur
BEC	Jaunâtre avec pointe noire.
YEUX	Brun foncé.
TETE	Front, vertex, nuque, joues et région auriculaire : d'une couleur noirâtre, liserée de brun-gris. Cette couleur est uniformément répartie.  En été, la tête est complètement noire
DOS et CROUPION	dos : noir écaillé de gris- brun (noir en été).  Croupion : Blanc
GORGE	Brun noisette.
POITRINE	De couleur brun noisette, sans voile, et uniformément répartie sur l'ensemble de la poitrine. La ligne qui sépare le brun de la poitrine et le blanc du ventre doit être régulière et légèrement arrondie.
FLANCS	La couleur des flancs est d'un brun clair avec de préférence deux rangées de spots noirs, le plus uniformément répartis. La première rangée sera souvent cachée par l'aile. Les spots des mâles sont plus larges et ont tendance à se grouper plus fort que chez la femelle.
VENTRE	Blanc pur.
AILES	Les scapulaires sont d'un brun noisette et sont bordées d'un étroit liseré clair.  La barre alaire a la même couleur que la poitrine (brun noisette).  Un petit miroir blanc est obligatoire.  Les rémiges primaires sont d'un noir brunâtre foncé  Les rémiges secondaires sont noir brunâtre avec le vexille externe brun clair..
QUEUE	Les rectrices sont noires. Les deux rectrices externes ont une grande tache blanche longitudinale sur le côté inférieur. Les sus-caudales médianes sont noirâtres avec un liseré brun à l'extrémité. L'extrémité de la queue est fourchue.
PATTES et DOIGTS	Chair foncé
ONGLES	noir

**Plumage nuptial**



Photos Philippe ROCHER

**Plumage hivernal**



## Pinson du nord femelle (*Fringilla montifringilla*) ~ Phénotype ancestral ~

<u>Taille du corps :</u>	14cm
Zone du plumage	couleur
TETE	Comme chez le mâle, mais les teintes sont brun gris dans l'ensemble. Les deux raies brunâtres partent du haut de la tête et descendent vers la nuque.
DOS	Dessin écaillé typique de couleur gris brun.
AILES	Comme le mâle, mais d'une couleur plus terne.
FLANCS	Les spots doivent être bien répartis et réguliers sur deux rangées et sur un fond brun clair.
POITRINE	La couleur ne peut pas être délavée, mais d'un brun noisette, qui sera
VENTRE	Blanc grisâtre.
QUEUE	Brun foncé et fourchue.
TETE	Comme chez le mâle, mais les teintes sont brun gris dans l'ensemble. Les deux raies brunâtres partent du haut de la tête et descendent vers la nuque.
DOS	Dessin écaillé typique de couleur gris brun..



## Venturons

# Venturon montagnard

(*Serinus cintrinella*)



Défauts :

- 1) Manque de luminosité dans la couleur,
- 2) Dessins flous et mal délimités,
- 3) Barres alaires irrégulières,
- 4) Manque d'élégance dans la forme.

## Venturon montagnard mâle (*Serinus cintrinella*) ~ Phénotype ancestral ~

Taille du corps : 12cm

Zone du plumage	Couleur
BEC	Pointu, fin, gris-noirâtre.
YEUX	Brun-noir.
TETE	Fine, dessus et côtés de la tête, nuque et côtés du cou gris-bleuté uni. Masque circulaire : jaune-vert lumineux couvrant le front, la région oculaire, le bas des joues et le menton
DOS	Vert-olive, marqué de stries gris-brun légères et assez floues.
GORGE – POITRINE	Jaune-vert, lumineux comme le masque.
FLANCS	Verts, lavés de gris.
VENTRE	Zone anale et sous-caudales : jaunes.
AILES	Rémiges : noir-verdâtre avec liseré externe gris-vert. Couvertures : noirâtres avec large liseré verdâtre, dessinant une double barre alaire.
CROUPION	Jaune-vert uni.
QUEUE	Rectrices : noir-verdâtre, liserées de gris-vert.
PATTES et DOIGTS	Gris-brun.
ONGLES	Brun-noir.
FORME GENERALE	Fine et élégante.



## Venturon montagnard femelle (*Serinus cintrinella*) ~ Phénotype ancestral ~

Taille du corps : 12cm

La femelle a la même livrée que le mâle avec des teintes un peu plus ternes, un masque moins étendu et des stries un peu plus marquées. Le gris-bleuté n'est pas interrompu à la gorge



## Venturon montagnard corse (*Serinus cintrinella corsica*) ~ Phénotype ancestral ~

Taille du corps : 12cm

Chez l'espèce *Serinus cintrinella corsicana* :

- le manteau est brun-chaud et la poitrine vert-jaune plus vif.
- La femelle est plus terne



# Serin

## Serin cini

(*Serinus serinus*)

Mâle



Femelle



Défauts :

- 1) Couleur terne et délavée chez le mâle,
- 2) Stries des flancs irrégulières,
- 3) Dessin de la tête irrégulier,
- 4) Barres alaires irrégulières.

## Serin cini mâle (*Serinus serinus*) ~ Phénotype ancestral ~

Taille du corps : 11cm

Zone du plumage	Couleur
BEC	Petit, court, conique et gris foncé.
YEUX	Brun foncé.
TETE	Jaune vif partant de la base du bec jusqu'aux yeux passant par du gris vert, strié de brun gris sur la nuque et les joues. Certains vieux mâles ont une tache jaune sur les joues
COU	Demi-collier jaunâtre.
DOS	Gris brunâtre strié de noir.
EPAULES	Gris brunâtre.
POITRINE	Jaune vif.
GORGE	Jaune vif.
FLANCS	Passant du jaune clair dans la région des épaules au gris clair près du
VENTRE	Gris clair.
AILES	Brun noir avec un liseré jaune verdâtre au bord extérieur des rémiges.
CROUPION	Jaune vif.
QUEUE	Brun noir
PATTES et DOIGTS	Couleur chair
ONGLES	Brun foncé



**Serin cini femelle (*Serinus serinus*)**  
**~ Phénotype ancestral ~**

Taille du corps : 11cm

La femelle a les mêmes caractéristiques que le mâle, mais la couleur jaune vif du mâle est plus atténuée chez la femelle


La femelle est plus striée sur la gorge, la poitrine et les flancs que le mâle. Les stries sont plus larges et plus distinctes



## *Sizerins*

# Sizerin flammé

*Acanthis flammea cabaret*  
1<sup>ère</sup> année



*Acanthis flammea cabaret*  
Adulte





Acanthis flammea flammea  
1<sup>ère</sup> année



Acanthis flammea flammea  
Adulte

Défauts concernant les sizerins cabaret et flammé en mâles et femelles :

- 1) Trop culotté (peut être légèrement culotté),
- 2) Traits sourciliers irréguliers,
- 3) Tache de menton (bavette) trop grande ou dentelée,
- 4) Stries des flancs irrégulières,
- 5) Couleur de bec rougeâtre (cette couleur est anormale),
- 6) Bande alaire irrégulière ou incomplète.

## Sizerin cabaret (*Acanthis flammea cabaret*)

### ~ Phénotype ancestral ~

Taille du corps : 11.5 cm

Zones du plumage	Couleur
Front	Brunâtre. La moitié du vertex est rouge carmin ou jaune brun selon les spécimens.
Joues, région auriculaire	Brun foncé. Dessin en forme de demi-lune.
Traits sourciliers	Couleur légèrement brunâtre. Étroits et réguliers. Du dessus des yeux à la nuque.
Cou, dos, épaules	Bruns avec des stries étroites et régulières brun foncé.
Gorge	Brun chaud. Petite bavette brun foncé.
Poitrine	Haut et côtés rose carmin, parfois brun chaud.
Flancs, ventre	Blanc sale. Flancs régulièrement striés de fines raies brun foncé qui partent à la hauteur des épaules et qui descendent tout le long des flancs.
Ailes, queue	Grandes rémiges et rectrices brun très foncé, liserées de brun très pâle aux extrémités. Deux barres alaires beige léger.
Croupion	Lavé de rose carmin ou brun chaud, strié de brun foncé.
Bec	Fin et pointu. Mandibule supérieure brunâtre et inférieure jaunâtre.
Yeux	Brun foncé.
Pattes, doigts	Brun foncé.
Ongles	Noirs.

Photo UOF



## Sizerin flammé (*Acanthis flammea flammea*) ~ Phénotype ancestral ~

Différence avec le sizerin cabaret :

- Plus grand en taille (13 - 15 cm)
- Couleur de fond plus pale, brun beige
- Stries brunes légèrement plus claires
- Barres alaires plus claires et plus visibles
- Tache plus claire dans le dos (caractéristique de l'espèce)

Sizerin flammea flammea 1<sup>ère</sup> année



## Sizerin flammé ~ Mutation brune ~

Remarque : Chez le brun facteur foncé, il n'y a pas de blanc sous la poitrine. Et le brun est plus chaud en couleur.

Taille du corps : 12 - 15 cm

Zones du plumage	Couleur
Front	Brun beige. Vertex rouge rosé.
Joues, région auriculaire	Brunes.
Traits sourciliers	Beiges.
Dos	Brun chaud avec des stries brun foncé étroites et régulières.
Gorge	Brun avec bavette d'un brun plus foncé.
Poitrine, flancs	Brun clair. Stries brun chaud sur le haut de la poitrine et des épaules vers l'arrière pour les flancs. Chez le mâle adulte, la poitrine peut être brun lavé de rose.
Ventre	Blanc sale.
Ailes, queue	Grandes rémiges et rectrices brunes avec liseré beige au bout des plumes. Barres alaires légèrement plus claires.
Croupion	Brun strié de brun chaud et lavé de rose.
Bec	Fin et pointu. Mandibule supérieure brunâtre et inférieure jaunâtre.
Pattes, doigts	Couleur chair.
Yeux, ongles	Brun foncé.

Dimorphisme sexuel : teintes et marques identiques chez les femelles mise à part la poitrine et les flancs légèrement plus clairs. Pas de rose sur la poitrine et le croupion.



Photo FOI



Photo UOF Sylvain Chartier

## Sizerin flammé

### ~ Mutation Pastel (ex-agate) ~

Taille du corps : 12 - 15 cm

Zones du plumage	Couleur
Front	Gris beige. La moitié du vertex est rouge rose ou parfois jaune brun.
Joues, région auriculaire	Gris brun lavé de rose. Dessin en forme de demi-lune.
Traits sourciliers	Gris beige. Étroits et réguliers, du dessus des yeux à la nuque.
Dos, cou, épaules	Gris clair avec stries régulières gris foncé.
Gorge	Gris clair avec petite bavette gris foncé.
Poitrine	Gris clair, parfois rosée, avec stries grises sur le haut.
Flancs	Gris clair avec stries grises régulières du haut de la poitrine et descendant le long des flancs.
Ventre	Blanc sale.
Ailes, queue	Grandes rémiges et rectrices gris foncé avec liseré gris clair à l'extrémité des plumes. Deux barres alaires gris clair.
Croupion	Gris clair strié de gris foncé.
Bec	Jaunâtre avec mandibule supérieure flammée.
Yeux	Noirs.
Pattes, doigts	Grisâtres.
Ongles	Noirs.

**Photo Bernard COMELIAU**




photo FOI

## Sizerin flammé

### ~ Mutation brun pastel (ex-isabelle) ~

Taille du corps : 12 - 15 cm

Zones du plumage	Couleur
Front	Beige. La moitié du vertex est rouge rose ou parfois jaune brun.
Joues, région auriculaire	Beiges lavées de rose. Lorums beiges.
Traits sourciliers	Beiges.
Dos	Beige clair avec stries brun clair.
Gorge	Beige clair avec petite bavette brun clair.
Poitrine	Beige clair, parfois rose, avec stries brun clair sur le haut.
Flancs	Beige clair striés de brun clair du haut de la poitrine et descendant le long des flancs.
Ventre	Blanc sale.
Ailes	Rémiges primaires beige clair. Rémiges secondaires brun clair. Couvertures brun clair avec extrémités beige clair formant les bandes alaires.
Queue	Rectrices beige clair avec liseré plus clair très peu visible.
Croupion	Beige clair striés de brun clair, parfois lavé de rose.
Bec	Jaunâtre avec mandibule supérieure flammée.
Yeux	Brun foncé.
Pattes, doigts, ongles	Couleur chair.

Photo Philippe ROCHER



# Sizerin flammé

## ~ Mutation écaillée (ex-pastel) ~

Taille du corps : 12 - 15 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	Brune striée de brun foncé.
Joues	Brunes avec région auriculaire brun foncé.
Dos, flancs	Bruns striés de brun foncé.
Gorge	Petite bavette grisâtre.
Poitrine	Brun chaud.
Ailes, queue	Rémiges primaires et secondaires brun foncé avec liseré beige. Couvertures brunes avec liseré brun roux. Barres alaires brun beige bien visibles.
Queue	Brune avec liseré beige.
Croupion	Beige clair striés de brun foncé.
Bec	Jaune avec bout de la mandibule supérieure brune.
Yeux	Noirs.
Pattes, doigts	Chair foncé.
Ongles	Noirs.

Photo Drizsmans



## Sizerin flammé

### ~ Mutation brun écaillé (ex-brun pastel) ~

Taille du corps : 12 - 15 cm

Zones du plumage	Couleur
Front	Brun clair avec calotte rouge.
Joues	Brunes.
Nuque	Brune avec légères stries plus brunes.
Dos	Brun avec stries plus brunes.
Gorge	Bavette grisâtre.
Poitrine	Brune sans stries visibles.
Flancs	Bruns avec stries légèrement visibles.
Ventre	Blanc sale.
Ailes	Rémiges primaires gris beige avec liserés brun clair. Rémiges secondaires et couvertures gris beige avec liserés bruns très visibles.
Queue, croupion	Gris beige avec liserés bruns.
Bec	Jaune.
Yeux	Noir brun.
Pattes, doigts, ongles	Couleur chair.

Photo KBOF



## Sizerin flammé

### ~ Mutation facteur foncé ~

Taille du corps : 12 - 15 cm

Zones du plumage	Couleur
Front	Brun foncé avec calotte rouge.
Traits sourciliers	Bruns et légèrement visibles.
Joues	Brunes, très foncées.
Nuque	Brun clair avec des stries brunes.
Lorums	Noirs.
Dos, épaules, cou	Brun foncé avec des stries étroites et régulières noir brun.
Gorge	Brun foncé avec une bavette noire.
Poitrine	Brun foncé avec des stries noir brun sur les côtés et un dessin écaillé noir brun au milieu.
Flancs	Couleur de fond très foncée, stries brun noir fines et régulières partant à la hauteur des épaules et descendant tout le long des flancs.
Ventre	Blanc sale voilé de brun.
Ailes	Rémiges primaires brun très foncé avec liseré clair très étroit. Deux barres alaires brunes.
Queue, croupion	Brun très foncé. Croupion strié de brun noir. Rectrices avec un liseré brun à l'extrémité.
Bec	Foncé avec la base de la mandibule inférieure jaunâtre.
Yeux, pattes, doigts, ongles	Noirs.



Photo Philippe ROCHER

# Sizerin flammé

## ~ Mutation pastel facteur foncé (ex-agate foncé) ~

Taille du corps : 12 - 15 cm

Zones du plumage	Couleur
Front, traits sourciliers	Gris beige. Moitié du vertex rouge rose ou jaune brun. Traits sourciliers étroits et réguliers
Joues, région auriculaire	Gris brun lavé de rose, dessin en forme de demi-lune.
Lorums	Grisâtres.
Dos, épaules, cou, croupion	Gris foncé avec des stries et régulières gris foncé. Stries du dos, du cou et des épaules entrecoupées
Gorge	Gris foncé avec une petite bavette gris foncé.
Poitrine	Gris foncé avec des stries grises sur le haut de la poitrine. Elle peut être rose chez les mâles adultes.
Flancs	Gris foncé et régulièrement striés de gris. Les stries partent du haut de la poitrine et descendent le long des flancs.
Ventre	Blanc sale.
Ailes	Grandes rémiges gris foncé liserées de gris clair à l'extrémité des plumes. Deux barres alaires gris foncé.
Queue	Rectrices gris foncé liserées de gris foncé à leur extrémité.
Bec	Jaunâtre avec mandibule supérieure flammée.
Pattes, doigts, ongles	Grisâtres.
Yeux,	Noirs.



Photo KBOF

# Sizerin flammé

## ~ Mutation brun facteur foncé ~

Taille du corps : 12 - 15 cm

Zones du plumage	Couleur
Front	Brun avec le vertex rouge foncé.
Joues, région auriculaire	Brun foncé.
Lorums	
Dos	Brun foncé avec un léger dessin dorsal.
Gorge	Brun foncé avec une très grande bavette plus foncée.
Poitrine	Brun foncé avec des stries visibles sur le haut de la poitrine.
Flancs	Brun striés de fines raies brun foncé partant des épaules vers l'arrière.
Ventre	Brun beige.
Ailes	Grandes rémiges brun foncé avec un très petit liseré beige. Barre alaire pratiquement invisible.
Croupion	Brun foncé strié.
Queue	Rectrices brun foncé avec un très petit liseré beige.
Bec	Jaunâtre flammé de brun
Pattes, doigts, ongles	Brun.
Yeux	Brun foncé.




Photo Drizsmans

# Sizerin flammé

## ~ Mutation phaéo ~

Taille du corps : 12 - 15 cm

Zones du plumage	Couleur
Front	Brun clair non-strié, avec la calotte rouge ou orange.
Nuque	Blanchâtre striée de brun.
Dos	Blanchâtre écaillé de brun.
Gorge, ventre	Blanchâtre.
Poitrine	Blanchâtre avec des écailles brunes sur le haut.
Flancs	Blanchâtres écaillés de brun.
Ailes	Rémiges primaires blanches avec léger liseré externe brun. Rémiges secondaires blanche avec un liseré brun plus large. Couvertures blanchâtres avec un large liseré brun à l'extrémité. Scapulaires blanchâtres avec des écailles brunes.
Croupion	Blanc avec de larges liserés bruns.
Queue	Rectrices blanches avec un liseré brun.
Bec	Jaune à base blanchâtre (comme les contours des yeux et la bavette).
Pattes, doigts	Couleur chair.
Ongles	Couleur corne.
Yeux	Rouges.



## Sizerin blanchâtre (*Acanthis hornemanni*)

### ~ Phénotype ancestral ~

Taille du corps : 14 cm

Zones du plumage	Couleur
BEC	Conique, fin et pointu de couleur de corne jaunâtre. La mandibule supérieure est plus foncée que l'inférieure.
YEUX	Noir
TETE	Ronde, bien enchâssée dans les épaules. Fine bande frontale et lorums brun-noirâtre. Tache rose carmin en forme de casque partant du front et couvrant la moitié du crâne. Ligne oculaire gris-brun surmontée d'un fin sourcil gris-beige. Arrière du crâne et nuque : gris-beige, striés de noirâtre. Dessin des joues légèrement marqué.
DOS	Beige-grisâtre marqué régulièrement de stries brun noir, avec une zone plus claire au centre.
GORGE	Petite bavette noir-brun au menton. Gorge blanchâtre, un très léger reflet rose peut parfois apparaître,
POITRINE	Blanchâtre comme la gorge, peut être aussi légèrement rose
FLANCS	Beige-grisâtre très clair, striés de brun-noir
VENTRE	Blanc.
AILES	Grandes rémiges : noirâtres, finement liserées de brun clair. Rémiges secondaires : noirâtres, portant un liseré gris-beige plus large. Couvertures : noirâtres, bordées de blanc sale formant une double barre alaire.
CROUPION	Blanchâtre, légèrement strié ou lavé de rose accepté
QUEUE	Rectrices : noirâtres, portant un liseré gris-beige
PATTES et DOIGTS	Brun-noir.
ONGLES	Noir
FORME GENERALE	Assez ronde, trapue et élégante

Défauts :

- 1) Trop culotté (peut être légèrement culotté),
- 2) Traits sourciliers irréguliers,
- 3) Bavette irrégulière,
- 4) Stries des flancs irrégulières,
- 5) Couleur du bec rougeâtre,
- 6) Bande alaire irrégulière ou incomplète,
- 7) Excès de coloration rouge.



## *Linottes*


# Linotte mélodieuse

*(Linaria cannabina)*

Mâle plumage nuptial



Femelle



## Linotte mélodieuse mâle (*Linaria cannabina*) ~ Phénotype ancestral ~

Taille du corps : 14cm

Zone du plumage	Couleur
BEC	Gris-brun clair en hiver avec la mandibule inférieure plus claire.
YEUX	Brun foncé.
TETE	Front et couronne : brun cannelle avec sourcils crème et une tache crème sur chaque joue.
DOS	Brun marron.
EPAULES	Brun marron.
POITRINE	De couleur beige striée de brun noir.
GORGE et MENTON	Blanchâtre avec stries brun foncé
FLANCS	Brun clair avec des fines stries brun foncé.
VENTRE	Blanchâtre.
AILES	Grandes rémiges primaires noires avec un liseré externe blanc. Rémiges secondaires : brun marron.
CROUPION	Cannelle clair, légèrement strié de raies interrompues.
QUEUE	Rectrices noires avec un liseré blanc le long du vexille externe.
PATTES et DOIGTS	Brunâtre.
ONGLES	Noir.
BEC	Gris-brun clair en hiver avec la mandibule inférieure plus claire.



## Linotte mélodieuse femelle (*Linaria cannabina*) ~ Phénotype ancestral ~

Taille du corps : 14cm

Mêmes caractéristiques que le mâle mais la poitrine, la tête et les flancs sont plus striés que chez le mâle.



Défauts :

- 1) Dessin de tête, de la gorge et des joues irréguliers,
- 2) Stries des flancs irrégulières,
- 3) Le vexille blanc des rémiges et des rectrices non visibles,
- 4) Dessin de la poitrine irrégulier chez la femelle.

# Linotte à bec jaune

(*Linaria flavirostis*)



Défauts :

- 1) Liseré blanc des rémiges pas visible,
- 2) Dessin irrégulier des flancs et de la poitrine,
- 3) Tête plate,
- 4) Pattes trop claires.

## Linotte à bec jaune (*Linaria flavirostris*) ~ Phénotype ancestral ~

Taille du corps : 14cm

Zone du plumage	Couleur
BEC	Petit, jaune avec pointe noirâtre.
YEUX	Brun foncé.
TETE	Petite et ronde. Front, couronne, joues et nuque : brun ocre, striés de noir. Lorums : de couleur rouille.
DOS	Brun ocre, strié de brun noirâtre.
EPAULES	Jaune ocre.
POITRINE	Brun ocre avec des stries brun foncé, partant du milieu de la poitrine vers les flancs.
GORGE	Brun ocre, légèrement strié.
FLANCS	Brun ocre avec des stries brun foncé et bien régulières.
VENTRE	Blanc sale.
AILES	Brun noirâtre avec un étroit liseré blanc le long du vexille externe des rémiges
CROUPION	Rose carmin dans la nature mais ocre roux n'est pas fautif.
QUEUE	Brun noirâtre avec liseré blanchâtre le long du vexille externe, l'extrémité de la queue fourchue.
PATTES et DOIGTS	Brun noirâtre.
ONGLES	Noir.

La femelle ressemble au mâle mais est de couleur plus pâle. Le croupion n'est jamais carmin mais brun gris léger avec des stries noires et étroites.  
inotte à bec jaune (*Carduelis flavirostris*)



# Tarin

## Tarin des aulnes

(*Spinus spinus*)



Défauts :

- 1) Lunettes : les 2 petites tâches jaune (mâle) ou grise (femelle) sur le front,
- 2) Traits sourciliers qui dépassent l'oeil en direction du front,
- 3) Traits sourciliers trop larges,
- 4) Bavette grande ou irrégulière,
- 5) Barres alaires irrégulière,
- 6) Absence du petit miroir,
- 7) Stries des flancs irrégulières,
- 8) Couleur de fond trop jaune pour les femelles,
- 9) Poitrine du mâle jaune intense au lieu de verdâtre.

## Tarin des aulnes mâle (*Spinus spinus*) ~ Phénotype ancestral ~

Taille du corps : 11 cm

Zones du plumage	Couleur
Front, vertex, occiput, calotte	Noirs avec la calotte légèrement pointillé de gris.
Joues, région auriculaire	Jaune grisâtre légèrement voilé.
Traits sourciliers	Jaunâtres partant de derrière l'œil et s'élargissant vers le cou.
Cou, nuque, scapulaires, dos	Verdâtres avec de fines stries foncées.
Poitrine, gorge	Vert jaunâtre. Certains mâles ont une petite bavette (nullement obligatoire) noire sur le haut de la gorge, elle doit être petite et régulière.
Flancs	Gris verdâtre avec des stries noirâtres qui doivent être bien régulières de chaque côté duc corps.
Ventre, région anale	Légèrement grisâtre.
Ailes	Grandes rémiges noir brunâtre avec le vexille externe jaune. Rémiges secondaires liserées de grisâtre à leur extrémité. Barre alaire jaune et petit miroir jaune.
Croupion	Jaune verdâtre.
Queue	Deux premiers tiers jaunes et extrémité noire. Rectrices médianes noires.
Bec	Fin, pointu, de couleur corne claire, flammé de noir.
Yeux	Brun foncé.
Pattes, doigts	Chair foncé.
Ongles	Noirs.

Remarque : les jeunes oiseaux peuvent montrer de légères lunettes.



## Tarin des aulnes femelle (*Spinus spinus*) ~ Phénotype ancestral ~

Taille du corps : 11 cm

Zones du plumage	Couleur
Front, vertex, occiput	Grisâtres avec de fines stries entrecoupées.
Joues, région auriculaire	Brunâtres voilés jaune.
Traits sourciliers	Beaucoup moins jaunes que chez le mâle mais plutôt de couleur brun grisâtre.
Cou, épaules, dos	Grisâtres finement striés de brun noirâtre.
Poitrine, gorge, flancs	Grisâtres dans l'ensemble. Les côtés de la poitrine et surtout les flancs ont un beau dessin strié, bien régulier, net, de couleur gris foncé.
Ventre, région anale	Grisâtres.
Ailes	Gris foncé avec les mêmes marques que le mâle.
Croupion	Jaune verdâtre, légèrement strié de gris foncé.
Queue	Deux premiers tiers jaune, le reste est noir-gris. Rectrices médianes noir-gris.
Sous-caudales	Présence d'un dessin écaillé.
Bec	Fin, pointu, de couleur corne claire, flammé de noir.
Yeux	Brun foncé.
Pattes, doigts	Chair foncé.
Ongles	Noirs.

Dimorphisme sexuel : les femelles doivent avoir une couleur de fond la plus grise possible.

**Photo Sylvain Chartier**



## Tarin des aulnes mâle (*Spinus spinus*)

~ Mutation brune ~

Taille du corps : 11 cm

Zones du plumage	Couleur
Front, occiput, vertex	Brun très foncé. La calotte est nuancée et pointillée de beige.
Joues	Jaune verdâtre lavées de brun.
Traits sourciliers	Jaunes.
Gorge	Bavette brun foncé si elle est présente.
Poitrine	Verdâtre lavée de beige.
Croupion	Jaune verdâtre.
Queue	Deux premiers tiers jaunes et extrémité brun très foncé. Rectrices médianes brunes, très foncées.
Ailes	Grandes rémiges brun foncé avec un léger liseré jaune le long du vexille externe. Epaules jaune verdâtre lorsqu'elles sont visibles.
Flancs	Couleur de fond blanc jaunâtre avec stries brun foncé.
Dos	Manteau couleur verdâtre strié de brun avec un voile brun clair sur le dos.
Bec	Couleur corne à la base avec l'extrémité de la mandibule supérieure brun noir.
Yeux	Brun foncé.
Pattes, doigts	Bruns.
Ongles	Foncés.



## Tarin des aulnes femelle (*Spinus spinus*)

~ Mutation brune ~

Taille du corps : 11 cm

Zones du plumage	Couleur
Front, occiput, vertex	Brun verdâtre striés de brun foncé.
Joues	Grisâtres lavées de brun.
Traits sourciliers	Jaunâtres.
Croupion	Jaune verdâtre légèrement strié de brun.
Queue	Premier tiers jaune et deux derniers tiers brun foncé. Rectrices médianes brunes, très foncées.
Ailes	Grandes rémiges brun foncé avec un léger liseré jaune le long du vexille externe. Rémiges secondaires au liseré jaunâtre avec barre alaire chamois et miroir jaune pâle.
Epaules	Jaune verdâtre lorsqu'elles sont visibles.
Poitrine	Blanc sale striée de brun.
Flancs	Couleur de fond beige avec stries brun foncé.
Dos	Manteau verdâtre lavé de brun assez foncé strié de brun foncé.
Bec	Couleur corne à la base avec l'extrémité de la mandibule supérieure brun noir.
Yeux	Brun foncé.
Pattes, doigts	Bruns.
Ongles	Foncés.



## Tarin des aulnes mâle (*Spinus spinus*) ~ Mutation brune diluée ~

Taille du corps : 11 cm

Zones du plumage	Couleur
Front, vertex, occiput	Bruns, lavés de vert. Vertex écaillé de beige.
Trait oculaire	Jaune.
Joues	Jaunâtres, lavées de brun.
Dos	Vert brunâtre strié de brun foncé.
Gorge, poitrine	Jaune clair avec un léger voile beige. Bavette brun foncé. Poitrine plus claire.
Flancs	Jaunâtres lavés de beige à l'avant et grisâtre lavé de beige à l'arrière. Stries brunes.
Ailes	Rémiges diluées en gris brun avec bord du vexille externe jaune brunâtre. Couvertures terminées par du jaune verdâtre, bordées de brun clair, d'où une bande alaire jaune verdâtre bordée de brun clair.
Croupion	Jaune verdâtre strié de brun foncé
Queue	Deux premiers tiers jaunâtres et extrémité gris brun. Rectrices médianes gris brun, très foncées. Sous-caudales jaune verdâtre striées de brun foncé.
Bec	Brunâtre, flammé de brun foncé à la mandibule supérieure.
Pattes, doigts	Chair.
Ongles, yeux	Brun foncé.



## Tarin des aulnes femelle (*Spinus spinus*) ~ Mutation brune diluée ~

Taille du corps : 11 cm

Zones du plumage	Couleur
Front, vertex, occiput	Bruns striés de brun foncé.
Trait oculaire	Jaune clair.
Joues	Jaunâtres lavées de brun foncé.
Poitrine, gorge	Gris clair légèrement striée de brun
Flancs	Gris clair lavé de beige. Stries brun foncé.
Croupion	Jaune verdâtre strié de brun foncé.
Dos	Brun verdâtre strié de brun foncé.
Ailes	Rémiges diluées en gris brun avec bord du vexille externe jaune brunâtre. Couvertures terminées par du jaunâtre, bordées de brun clair, d'où une bande alaire jaunâtre bordée de brun clair.
Queue	Premier tiers jaunâtre et deux derniers tiers bruns. Rectrices médianes brun gris. Sous-caudales gris beige striées de brun.
Bec	Brunâtre flammé de brun foncé à la mandibule supérieure.
Yeux	Brun foncé.
Pattes, doigts	Chair.
Ongles	Brun foncé.

Photo Philippe ROCHER



## Tarin des aulnes mâle (*Spinus spinus*)

~ Mutation brune double diluée ~

Taille du corps : 11 cm

Zones du plumage	Couleur
Vertex, occiput, dos	Brun beige. Manteau sans stries.
Traits sourciliers	Jaunes.
Joues	Brunes striées de blanc.
Gorge, poitrine, flancs	Jaunâtre légèrement striée de brun beige. Bavette pratiquement devenue invisible.
Ventre	Blanc sale.
Couvertures	Petites brun beige ; Moyennes et grandes jaune pâle bordées de jaune foncé.
Rémiges	Secondaires gris très clair avec vexille externe jaune et portant une bande alaire jaune intense. Primaires gris très clair avec vexille externe jaune. Pas de miroir visible.
Croupion	Jaune strié de brun.
Queue	Deux premiers tiers jaunes et extrémité gris très clair avec vexille externe jaune. Rectrices médianes gris très clair.
Bec	Chair flammé à l'extrémité de la mandibule supérieure.
Yeux	Brun foncé.
Pattes, doigts	Chair.
Ongles	Corne claire.



Photo : Jean-Pierre Hennbique

## Tarin des aulnes femelle (*Spinus spinus*)

~ Mutation brune double diluée ~

Taille du corps : 11 cm

Zones du plumage	Couleur
Vertex et occiput, manteau	Brun beige avec un dessin strié léger. Manteau sans stries.
Traits oculaires	Jaune clair.
Joues	Brunes, striées de blanc.
Gorge, poitrine	Gris très clair. Poitrine striée de brun beige.
Flancs	Beiges, striés de brun.
Croupion	Jaune strié de brun.
Ventre	Blanc sale.
Queue	Premier tiers jaunâtre et deux derniers tiers beiges avec vexille externe jaunâtre. Rectrices médianes beiges.
Couvertures	Petites brun beige ; Moyennes et grandes jaunâtres bordée de jaune foncé.
Rémiges	Secondaires beige avec vexille externe jaune pâle et portant une bande alaire jaune. Primaires beiges avec vexille externe jaune pâle. Pas de miroir visible.
Bec	Chair flammé à l'extrémité de la mandibule supérieure.
Yeux	Brun foncé.
Pattes, doigts	Chair.
Ongles	Corne claire.

Photo Philippe ROCHER



## Tarin des aulnes mâle (*Spinus spinus*)

~ Mutation diluée ~

Taille du corps : 11 cm

Zones du plumage	Couleur
Vertex, occiput, dos	Gris très foncé lavé de vert.
Traits sourciliers	Jaunes.
Joues	Verdâtres lavées de gris.
Dos	Vert strié de gris foncé.
Poitrine, gorge	Vert jaunâtre lavée de gris clair. Bavette gris foncé si elle existe.
Flancs	Gris clair à l'arrière et gris clair lavé de verdâtre à l'avant. Stries gris foncé.
Ventre	Blanc sale.
Couvertures	Se terminent par du vert clair très lumineux qui donne une bande alaire verte avec des épaules vertes. Miroir jaune pâle.
Rémiges, rectrices médianes	Gris verdâtre. Rémiges avec bord du vexille externe jaunâtre.
Croupion, sous-caudales	Jaune verdâtre légèrement strié de gris.
Queue	Deux premiers tiers jaunes et extrémité gris verdâtre.
Bec	Brunâtre flammé de noir à l'extrémité de la mandibule supérieure.
Yeux	Brun foncé.
Pattes, doigts	Chair foncée.
Ongles	foncés.




## Tarin des aulnes femelle (*Spinus spinus*)

~ Mutation diluée ~

Taille du corps : 11 cm

Zones du plumage	Couleur
Vertex, front, occiput	Gris striés de gris foncé.
Traits oculaires	Jaunâtres.
Joues	Gris brun, légèrement striées.
Gorge	Gris très clair légèrement striée de gris.
Poitrine	Gris très clair striée de gris foncé.
Dos	Gris brun, lavé de vert et strié de gris foncé.
Flancs	Gris clair striés de gris foncé avec un voile brun léger.
Croupion	Jaune verdâtre strié de gris.
Queue	Premier tiers jaunâtre et deux derniers tiers gris verdâtre. Rectrices médianes entièrement gris verdâtre. Sous-caudales gris clair striées de gris.
Ailes	Rémiges gris verdâtre avec le bord du vexille externe jaunâtre. Couvertures primaires et secondaires terminées par un bord vert lavé de chamois avec miroir jaune très pâle.
Bec	Brunâtre.
Yeux	Brun foncé.
Pattes, doigts	Chair foncé.
Ongles	Foncés.



## Tarin des aulnes mâle (*Spinus spinus*)

~ Mutation double diluée ~

Taille du corps : 11 cm

Zones du plumage	Couleur
Vertex, occiput	Gris brun clair. Vertex avec un léger dessin.
Traits oculaires	Jaunes.
Joues	Gris verdâtre striées de clair.
Gorge	Jaunâtre légèrement striée de brun. Bavette pratiquement invisible.
Poitrine, flancs	Jaunâtre légèrement striée de gris brunâtre.
Ventre	Blanc sale.
Dos	Manteau gris brun jusqu'aux épaules, sans stries.
Croupion	Jaune strié de gris brun.
Queue	Deux premiers tiers jaunes et extrémité gris clair avec vexille externe jaune. Rectrices médianes gris clair.
Couvertures alaires	Petites : gris brun. Grandes : jaune pâle bordées de jaune intense.
Rémiges	Secondaires : gris clair avec vexille jaune et portant une bande alaire jaune intense. Primaires : gris clair avec vexille externe jaune. Pas de miroir.
Bec	Chair, flammé à l'extrémité de la mandibule supérieure.
Yeux	Brun foncé.
Pattes, doigts	Chair.
Ongles	Couleur corne.



## Tarin des aulnes femelle (*Spinus spinus*)

~ Mutation double diluée ~

Taille du corps : 11 cm

Zones du plumage	Couleur
Vertex, occiput	Gris brun clair avec un dessin strié très léger.
Traits oculaires	Jaune clair.
Joues	Gris brun clair, striées de clair.
Gorge, poitrine	Gris clair. Poitrine légèrement striée de gris brun.
Dos	Manteau gris brun jusqu'aux épaules, sans stries.
Flancs	Brun clair, striés de gris brun.
Croupion	Jaune, strié de gris brun.
Queue	Premier tiers jaune et deux derniers tiers gris clair avec vexille externe jaunâtre. Rectrices médianes entièrement gris clair.
Couvertures alaires	Petites : gris brun. Moyenne : gris verdâtre bordées de jaune intense. Grandes : gris verdâtre bordées de jaune intense.
Rémiges	Secondaires : gris clair avec vexille jaune pâle et portant une bande alaire jaune. Primaires : gris clair avec vexille externe jaune pâle. Pas de miroir.
Bec	Chair flammé à l'extrémité de la mandibule supérieure.
Yeux	Brun foncé.
Pattes, doigts	Chair.
Ongles	Couleur corne.



**Tarin des aulnes mâle (*Spinus spinus*)**  
~ Mutation pastel ~



## Tarin des aulnes femelle (*Spinus spinus*)

~ Mutation pastel ~

Taille du corps : 11 cm

Zones du plumage	Couleur
Vertex, occiput, front	Gris clair striés de noir.
Traits sourciliers	Gris clair.
Joues, régions auriculaires	Grisâtres.
Poitrine	Gris clair striée de noir dilué.
Dos	Manteau grisâtre de noir dilué.
Flancs	Gris clair avec des tries d'un gris très foncé.
Croupion	Grisâtre légèrement strié de gris foncé.
Queue	Premier tiers jaune et deux derniers tiers gris très foncé. Rectrices médianes entièrement gris très foncé.
Rémiges	Grandes : gris foncé avec bords externes liserés de jaune. Le liseré des rémiges secondaires est grisâtre. Barre alaire et miroir jaune clair.
Bec	Couleur chair flammé.
Yeux	Noirs.
Pattes, doigts	Chair foncée.
Ongles	Foncés.



## Tarin des aulnes mâle (*Spinus spinus*)

### ~ Mutation pastel dilué ~

**Taille du corps** : 11 cm  
autosomal

Hérédité pastel : récessif lié au sexe - dilué : dominant

Zones du plumage	Couleur
Calotte	Gris foncé.
Traits sourciliers, croupion	Jaunes.
Joues	Jaune verdâtre bien dessinées de gris foncé. Légère décoloration autour du bec.
Gorge	Bavette gris foncé si elle est présente.
Poitrine	Jaune verdâtre voilé de gris
Flancs	Jaunâtres, plus clairs que la poitrine, avec stries gris foncé.
Dos	Vert jaunâtre avec stries gris foncé bien visibles.
Queue	partie supérieure gris foncé. Partie inférieure : les deux premiers tiers jaunes et extrémité gris foncé.
Rémiges	Grandes : gris foncé avec liseré jaune pour le vexille externe. Secondaires : gris foncé avec liseré jaune à l'extrémité.
Couvertures alaires	Gris foncé. Barre alaire jaune bien visible.
Bec	Couleur chair flammé à la mandibule supérieure.
Yeux	Noirs.
Pattes, doigts	Chair.
Ongles	Couleur corne.



## Tarin des aulnes femelle (*Spinus spinus*)

### ~ Mutation pastel dilué ~

Taille du corps : 11 cm  
autosomal

Hérédité pastel : récessif lié au sexe - dilué : dominant

Zones du plumage	Couleur
Calotte	Jaune verdâtre claire, striée de gris foncé.
Joues	Jaunes verdâtre lavées de gris.
Gorge	Grisâtre.
Poitrine	Grisâtre avec légères stries gris foncé.
Dos	Vert jaunâtre pâle avec stries dorsales gris foncé bien visibles.
Flancs	Grisâtres, très clairs, striés de gris foncé.
Croupion	Jaunâtre.
Queue	Partie supérieure gris foncé. Partie inférieure : le premier tiers est jaunâtre et le reste est gris foncé.
Rémiges	Grandes : gris foncé avec liseré jaune le long du vexille externe. Secondaires : gris foncé avec un liseré jaune à l'extrémité.
Couvertures	Gris foncé. Barre alaire jaunâtre.
Bec	Couleur chair flammé à la mandibule supérieure.
Yeux	Noirs.
Pattes, doigts	Couleur chair.
Ongles	Couleur corne.



## Tarin des aulnes mâle (*Spinus spinus*)

~ Mutation Brune Pastel ~

Taille du corps : 11 cm

Zones du plumage	Couleur
Vertex, occiput	Brun clair.
Traits sourciliers	Jaunes.
Joues	Brun clair lavées de jaune.
Gorge, poitrine	Jaunes. Bavette brun claire si elle existe.
Flancs	Jaunâtres avec stries brun clair.
Dos	Manteau brun clair très légèrement strié.
Ventre	Blanc sale.
Croupion	Jaune.
Queue	Deux premiers tiers jaunes et le reste est brun clair. Rectrices médianes entièrement brunes.
Rémiges	Grandes : brun clair avec liseré jaune. Bandes alaires et miroir jaune.
Couvertures alaires	Petites : brun clair. Moyennes : brun clair avec liseré jaune (bande alaire). Grandes : brun clair avec liseré jaune.
Bec	Chair, flammé de brun à l'extrémité de la mandibule supérieure.
Yeux	Bruns.
Pattes, doigts	Couleur chair.
Ongles	Couleur chair.





Photo Jean-Michel EYTORFF



## Tarin des aulnes femelle (*Spinus spinus*)

~ Mutation Brune Pastel ~

Taille du corps : 11 cm

Zones du plumage	Couleur
Front, vertex, occiput, dos	Blanc sale lavées de jaune et striés de brun clair.
Traits sourciliers	Jaune clair et peu visibles.
Joues	Jaunâtres striées de brun clair.
Gorge	Blanc sale
Poitrine	Blanc sale lavée de jaune pâle avec stries brun clair sur le haut de la poitrine.
Flancs	Blanc sale striés de brun clair.
Ventre	Blanc sale.
Croupion	Blanc sale lavé de jaune.
Queue	Premier tiers jaune et deux derniers tiers brun clair. Rectrices médianes entièrement brunes.
Ailes	Identiques aux ailes des mâles mais avec un jaune moins intense.
Bec	Chair, flammé de brun à l'extrémité de la mandibule supérieure.
Yeux	Bruns.
Pattes, doigts	Couleur chair.
Ongles	Couleur chair.



## Tarin des aulnes mâle (*Spinus spinus*)

~ Mutation Brune Pastel dilué ~

Taille du corps : 11 cm

Zones du plumage	Couleur
Vertex, occiput, joues	Jaunes, voilés de beige.
Traits sourciliers	Jaunes mais peu visibles.
Gorge, poitrine, dos, croupion	Jaunes, voilés de beige. Pas de stries.
Flancs	Jaunes légèrement striés de beige.
Ventre	Blanc sale.
Queue	Deux premiers tiers jaunes et le reste est beige clair. Rectrices médianes entièrement beiges.
Rémiges	Beige clair avec liserés jaunes.
Couvertures alaires	Jaunes avec liserés et extrémités beige clair. Barre alaire visible.
Bec	Chair, flammé de brun à l'extrémité de la mandibule supérieure.
Yeux	Bruns.
Pattes, doigts	Couleur chair.
Ongles	Couleur chair.

Photo Jean-Michel EYTORFF



## Tarin des aulnes femelle (*Spinus spinus*)

~ Mutation Brune Pastel dilué ~

Taille du corps : 11 cm

Zones du plumage	Couleur
Front, vertex, occiput	Beige clair lavés de jeune.
Traits sourciliers	Jaune clair.
Gorge, poitrine	Blanc sale avec le moins de jaune possible.
Dos	Manteau jaune lavé de beige et légèrement strié.
Flancs	Blanc sale striés de beige clair.
Ventre	Blanc sale.
Croupion	Jaune lavé de beige clair.
Queue	Premier tiers jaune et deux derniers tiers beiges. Rectrices médianes entièrement beiges.
Couvertures	Jaunes avec liserés et extrémités beiges.
Rémiges	Beiges avec liseré jaune.
Bec	Chair, flammé de brun à l'extrémité de la mandibule supérieure.
Yeux	Bruns.
Pattes, doigts	Couleur chair.
Ongles	Couleur chair.

~ Photo Jean Michel EYTORFF



## Tarin des aulnes mâle (*Spinus spinus*)

~ Mutation ivoire ~

Taille du corps : 11 cm

Zones du plumage	Couleur
Front, vertex, occiput, calotte	Noirs. Calotte légèrement pointillée de gris.
Joues, région auriculaire	Jaune ivoire grisâtre légèrement voilé.
Traits sourciliers	Jaune ivoire, partant de derrière l'œil et s'élargissant vers le cou.
Cou, dos	Nuque gris verdâtre avec de fines stries très foncées.
Gorge, poitrine, épaules	Vert gris. Certains mâles ont une petite bavette noire et régulière sur le haut de la gorge.
Flancs	Gris vert avec des stries noires bien régulières. La couleur devient plu claire vers l'arrière des flancs.
Ventre	Région anale légèrement grisâtre.
Croupion	Gris vert.
Queue	Deux premiers tiers des rectrices jaune ivoire et extrémité noire. Deux rectrices médianes noires.
Rémiges	Grandes rémiges noir brunâtre avec vexille externe jaune ivoire. Barre alaire et petit miroir jaune ivoire.
Bec	Couleur corne claire flammé de noir.
Yeux	Brun foncé.
Pattes, doigts	Couleur chair.
Ongles	Noirs.




Photo A. Van Mingeroet

## Tarin des aulnes femelle (*Spinus spinus*)

~ Mutation ivoire ~

Taille du corps : 11 cm

Zones du plumage	Couleur
Front, vertex, occiput	Grisâtres avec de fines stries.
Joues, région auriculaire	Brunâtres, voilées de jaune ivoire.
Traits sourciliers	Beaucoup moins jaunes que chez le mâle et plutôt brun grisâtre.
Cou, dos, épaules	Grisâtres finement striés de noir brunâtre.
Gorge, poitrine, flancs	Grisâtre dans l'ensemble. Côtés de la poitrine et flancs avec un beau dessin strié régulier et net de couleur gris foncé.
Ventre	Grisâtre.
Croupion	Gris vert légèrement strié de gris foncé.
Queue	Premier tiers des rectrices jaune ivoire, le reste est noir gris. Deux rectrices médianes noir gris. Sous-caudales avec dessin écaillé.
Ailes	Gris foncé avec les mêmes marques que les mâles.
Bec	Couleur corne claire flammé de noir.
Yeux	Brun foncé.
Pattes, doigts	Couleur chair.
Ongles	Noirs.

Photo Bernard CORMELIAU



## Tarin des aulnes mâle (*Spinus spinus*)

~ Mutation Pastel ivoire ~

Taille du corps : 11 cm

Zones du plumage	Couleur
Front, vertex, occiput, calotte	Gris foncé. Calotte pointillée de gris.
Joues, région auriculaire	Vertes lavées de gris.
Traits sourciliers	Jaune ivoire.
Dos	Manteau verdâtre voilé de gris avec des stries noires.
Gorge, poitrine, flancs	Vert jaunâtre ivoire. Flancs à stries grises très foncées. Gorge avec parfois une bavette gris foncé.
Croupion	Verdâtre.
Queue	Deux premiers tiers des rectrices jaune ivoire et extrémité gris très foncé. Deux rectrices médianes entièrement gris foncé.
Ailes	Grandes rémiges gris foncé avec bords externes liserés de jaune ivoire. Rémiges secondaires avec liseré grisâtre. Barre alaire et miroir jaune ivoire clair.
Bec	Couleur chair flammé.
Yeux	Noirs.
Pattes, doigts	Chair foncé.
Ongles	Foncés.



## Tarin des aulnes femelle (*Spinus spinus*)

~ Mutation Pastel ivoire ~

Taille du corps : 11 cm

Zones du plumage	Couleur
Front, vertex, occiput, calotte	Gris clair striés de noir.
Joues, région auriculaire	Grisâtres.
Traits sourciliers	Gris clair.
Dos	Manteau grisâtre strié de noir dilué.
Poitrine	Gris clair strié de noir dilué.
Flancs	Couleur de fond gris clair avec des stries d'un gris très foncé.
Croupion	Grisâtre, légèrement strié de gris foncé.
Queue	Le premier tiers des rectrices jaune ivoire et le reste est gris très foncé. Deux rectrices médianes entièrement gris très foncé.
Ailes	Grandes rémiges gris foncé avec bords externes liserés de jaune ivoire. Rémiges secondaires avec liseré grisâtre. Barre alaire et miroir jaune ivoire clair.
Bec	Couleur chair flammé.
Yeux	Noirs.
Pattes, doigts	Chair foncé.
Ongles	Foncés.



Photo Jean Michæl EYTORFF



# Chardonnerets

## Chardonneret élégant

(*Carduelis carduelis carduelis*)



Défauts :

- 1) Dessin du masque irrégulier,
- 2) Couleur du masque irrégulière (points noirs ou blancs dans le masque bicolore),
- 3) Calotte noire, bande alaire et champignon irrégulier,
- 4) Dessin de la nuque et des ailes pas symétrique.

**Attention aux tailles intermédiaires.**

Tailles

Carduelis carduelis----->	13/14 cm
Carduelis britannica----->	13 cm
Carduelis parva----->	11/12 cm
Carduelis tschusii----->	11 cm
Carduelis frigoris----->	15 cm
Carduelis major----->	16 cm
Carduelis balcanica----->	13 cm
Carduelis niediecki----->	12/14 cm
Carduelis brevirostris----->	12,5 cm

## Attention aux tailles intermédiaires.

# Chardonneret élégant (Major)

(*Carduelis carduelis major*)

### Taille 16 cm

- marque de nuque blanche et importante.
- joues, gorge, champignons blancs.
- brides du casque larges, très noires contournant l'arrière de la joue.
- dessin pectoral chamois intense et présentant souvent des traces noirâtres et jaunes. Les limites du champignon sont larges et bien nettes.
- flancs chamois bien marqués, croupion blanc lavé de beige.



**Attention aux tailles intermédiaires.**

## Chardonneret élégant (britannica)

*(Carduelis carduelis britanica)*

**Taille : 13 cm**

- marque de nuque étroite, blanc sale
- gorge et joues, fortement lavées de beige
- champignons et ventre blancs et ternes,
- flancs et dessin pectoral brun,
- manteau brun foncé,
- croupion blanc sale fortement lavé de brun.



**Attention aux tailles intermédiaires.**

## Chardonneret élégant (parva)

(*Carduelis carduelis parva*)

### Taille 11/12 cm

- joues, gorge, champignons et ventre blancs,
- dessin pectoral et flancs chamois,
- croupion blanc lavé de beige,
- marque de nuque blanche et étroite,
- bec long, fort et pointu qui peut parfois paraître disproportionné avec la taille de l'oiseau



## Attention aux tailles intermédiaires.

### Chardonneret élégant (*tschusii*) (*Carduelis carduelis tschusii*)

#### Taille 11 cm,

- marque de nuque quasiment inexistante,
- joues lavées de brun,
- gorge, champignons et ventre blancs,
- dessin pectoral et flancs chamois,
- manteau brun jusqu'à la base du casque
- croupion blanc lavé de beige,
- bec long, fort et pointu (moins long que chez parva)



## Attention aux tailles intermédiaires.


### Chardonneret élégant (*Carduelis carduelis*)

~ Phénotype ancestral ~

Taille du corps : 13 – 14 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	Masque rouge écarlate englobant le front, le menton et la moitié des joues jusqu'à l'œil. Derrière le masque, large tache blanche (parfois brune selon les sous-espèces) sur les côtés de la tête et la gorge.
Cou	Collier blanc dans la nuque séparant le noir de la nuque et le brun du dos.
Dos	Brun foncé.
Calotte, nuque, lorums épaules, ailes	Noirs. Large barre alaire jaune vif. Points blancs à l'extrémité de chaque rémige.
Poitrine	Brune sur les côtés avec un champignon blanc au centre.
Flancs	Brunâtre en s'éclaircissant vers le ventre.
Ventre	Blanc.
Croupion	Blanchâtre.
Queue	Noire. Points blancs à l'extrémité de chaque rectrice. Grande tache blanche à la partie inférieure des rectrices externes.
Yeux	Brun foncé.
Bec, pattes, doigts	Couleur chair. Extrémité du bec noire et effilée.
Ongles	Foncés.

Dimorphisme sexuel : chez la femelle, couverture des épaules brun verdâtre et non noire comme chez les mâles.



## Attention aux tailles intermédiaires.

### Chardonneret élégant

~ Mutation brun ~

Taille du corps : 13 – 14 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	Masque rouge orange englobant le front, le menton, et la moitié des joues jusqu'à l'œil. Derrière le masque, large tache blanche (parfois brune selon les sous-espèces) sur les côtés de la tête et la gorge.
Calotte, nuque, épaules, lorums	Brun foncé.
Cou	Collier blanc dans la nuque séparant le brun de la nuque et le brun du dos.
Dos	Brun chaud uniforme.
Poitrine	Brun chaud avec champignon blanc au centre.
Flancs	Bruns en s'éclaircissant vers l'arrière.
Ventre	Blanc sale.
Ailes	Brun foncé avec large barre alaire jaune vif. Points blancs à l'extrémité de chaque rémige.
Croupion	Blanchâtre lavé de brun.
Queue	Brun foncé, avec pointillés blancs à l'extrémité des rectrices. Grande tache blanche à la partie inférieure des rectrices externes.
Yeux	Brun foncé.
Pattes, doigts, ongles, bec	Couleur chair.

Dimorphisme sexuel : chez la femelle, couverture des épaules brun verdâtre et non brune comme chez les mâles.



## Attention aux tailles intermédiaires.

### Chardonneret élégant

~ Mutation agate ~

Taille du corps : 13 – 14 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	Masque rouge écarlate. Derrière le masque, large tache blanche sur les côtés de la tête et la gorge.
Calotte, nuque, épaules, lorums	Noirs.
Cou	Collier blanc dans la nuque séparant le noir de la nuque et le gris beige du manteau.
Dos	Gris soutenu uniforme.
Poitrine	Gris avec champignon blanc au centre.
Flancs	Gris en s'éclaircissant vers l'arrière.
Ventre	Blanc sale.
Ailes	Noires avec large barre alaire jaune vif. Points blancs à l'extrémité de chaque rémige.
Croupion	Blanchâtre lavé de gris beige.
Queue	Noire, avec pointillés blancs à l'extrémité des rectrices. Grande tache blanche à la partie inférieure des rectrices externes.
Yeux	Brun foncé.
Pattes, doigts, bec	Couleur chair. Extrémité du bec flammée de noir.
Ongles	Foncés.

Dimorphisme sexuel : chez la femelle, couverture des épaules brun verdâtre et non brune comme chez les mâles.

Photo UOF  
Jean-Pierre Hennbique



## Attention aux tailles intermédiaires.

### Chardonneret élégant

~ Mutation pastel ~

Taille du corps : 13 – 14 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	Masque rouge orange avec dessin gris sur le crâne et la nuque.
Joues	Blanc sale.
Gorge	Blanc sale sous le masque.
Dos, flancs	Gris brun clair.
Poitrine	Gris brun clair avec champignon blanc au centre.
Ailes	Rémiges primaires et secondaires gris foncé le plus égal possible avec extrémités blanches. Miroir jaune.
Couvertures	Gris foncé.
Croupion	Gris brun clair se transformant en blanc sale vers la queue.
Queue	Rectrices grises avec taches blanches sur les deux rectrices externes.
Yeux	Noirs.
Pattes, doigts, ongles, bec	Couleur chair.



## Attention aux tailles intermédiaires.

### Chardonneret élégant

~ Mutation isabelle ~

Taille du corps : 13 – 14 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	Masque rouge orange englobant le front, le menton, et la moitié des joues jusqu'à l'œil. Derrière le masque, large tache blanche (parfois brune selon les sous-espèces) sur les côtés de la tête et la gorge.
Calotte, nuque, lorums	Brun beige.
Cou	Collier blanc séparant le brun beige de la nuque et le brun beige du manteau.
Dos, flancs	Brun beige. Les flancs s'éclaircissent vers l'arrière.
Épaules	Brunes.
Poitrine	Brun beige avec champignon blanc au centre.
Ventre	Blanc sale.
Ailes	Brun beige avec large barre alaire jaune vif. Points blancs à l'extrémité de chaque rémige.
Croupion	Blanchâtre lavé de gris.
Queue	Brun beige, avec pointillés blancs à l'extrémité des rectrices. Grande tache blanche à la partie inférieure des rectrices externes.
Yeux	Bruns.
Pattes, doigts, ongles, bec	Couleur chair.

**Dimorphisme sexuel** : chez la femelle, couverture des épaules brun verdâtre et non brune comme chez les mâles.



## Attention aux tailles intermédiaires.

### Chardonneret élégant

~ Mutation satiné ~

Taille du corps : 13 – 14 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	Masque rouge orange englobant le front, le menton, et la moitié des joues jusqu'à l'œil. Derrière le masque, large tache blanche (parfois brune selon les sous-espèces) sur les côtés de la tête et la gorge.
Calotte, nuque, lorums	Beiges.
Cou, gorge	Blancs. Collier blanc séparant le beige de la nuque et le beige du dos.
Dos	Blanc voilé de beige.
Epaules	Beiges.
Poitrine	Blanc sale voilé de beige avec champignon banc visible au centre.
Flancs	Blanc sale légèrement voilé de beige.
Ventre	Blanc sale.
Ailes	Beiges, avec large barre alaire jaune vif. Points blancs à l'extrémité de chaque rémige.
Croupion	Blanchâtre lavé de beige.
Queue	Beige, avec pointillés blancs à l'extrémité des rectrices. Grande tache blanche à la partie inférieure des rectrices externes.
Yeux	Rouges.
Pattes, doigts, ongles, bec	Couleur chair.



## Attention aux tailles intermédiaires.

### Chardonneret élégant

~ Mutation blanc avec masque orange ~

Taille du corps : 13 – 14 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	Blanche. Masque orange qui ne va pas jusqu'à la base du bec.
Dos	Blanc.
Poitrine	Blanche.
Flancs	Blancs.
Rémiges	Rémiges primaires blanches avec un liseré jaune dans leur partie médiane. Rémiges secondaires blanches.
Couvertures	Couvertures primaires blanches avec quelques plumes jaunes. Couvertures secondaires et tertiaires blanches.
Croupion	Blanc.
Queue	Blanche avec un léger liseré jaune.
Bec	Couleur chair, légèrement flammé à l'extrémité de la mandibule supérieure.
Yeux	Noirs.
Pattes, doigts	Couleur chair.
Ongles	Blancs.

Photo RBOF



## Attention aux tailles intermédiaires.

### Chardonneret élégant

~ Mutation tête blanche ~

Taille du corps : 13 – 14 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	Absence de casque noir remplacé par une couleur blanche la plus uniforme possible (crâne, lorums, nuque). Seules subsistent de chaque côté de la tête les traces des brides du casque, de forme triangulaire et de couleur rouge ou orange.
Masque	Rouge lumineux, qui peut-être plus étendu sur la face et le front.
Cou, gorge	Mêmes caractéristiques que le phénotype sauvage, avec des miroirs alaires qui s'étendent aux grandes couvertures et pouvant remonter à la pliure de l'épaule (il est aussi visible à l'envers de l'aile).
Dos	
Epauls	
Poitrine	
Flancs	
Ventre	
Ailes	
Croupion	
Queue	
Yeux	
Pattes, doigts, ongles, bec	Cette mutation récessive autosomale a été transposée aux autres mutations existantes (brun, agate, etc.)



Photo Sylvain Chartier

## Attention aux tailles intermédiaires.

### Chardonneret élégant

~ Mutation jaune ~

Taille du corps : 13 – 14 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	<p>L'ensemble du plumage présente une suffusion jaune, visible surtout sur les parties dépourvues de pigments mélaniques : joues, nuque, poitrail, croupion.</p> <p>La couleur jaune doit être pure, intense, le plus uniforme possible.</p> <p>Le masque facial est très lumineux, plus étendu et plus diffus que chez les sujets présentant le patron classique.</p> <p>Cette mutation à hérédité dominante a été transposée à toutes les variétés existantes.</p>
Calotte, nuque, lorums	
Cou, gorge	
Dos	
Epaules	
Poitrine	
Flancs	
Ventre	
Ailes	
Croupion	
Queue	
Yeux	
Pattes, doigts, ongles, bec	



## Attention aux tailles intermédiaires.

### Chardonneret élégant


~ Mutation aminet ~ ( ex Eumo)

Taille du corps : 13 – 14 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	Masque rouge écarlate englobant le front, le menton, et la moitié des joues jusqu'à l'œil. Derrière le masque, large tache blanche (parfois brune selon les sous-espèces) sur les côtés de la tête et la gorge.
Calotte, nuque, lorums	calotte et lorums le plus noir possible. Nuque blanche.
Cou, gorge	Collier blanc formant une séparation entre le noir de la nuque et le manteau beige-rosé.
Dos	De couleur beige-rosé.
Epaules	marbrées brun-noir chez le mâle et brun verdâtre chez la femelle.
Poitrine	Beige avec voile jaunâtre le champignon est quasiment invisible.
Flancs	Beige très clair voilé de blanc.
Ventre	Blanc.
Ailes	Rémiges noires, avec large barre alaire jaune vif. Points blancs à l'extrémité de chaque rémige.
Croupion	Le plus blanc possible.
Queue	noire, avec points blancs à l'extrémité des rectrices. Grande tache blanche à la partie intérieure des rectrices externes.
Yeux	Brun foncé.
Pattes, doigts, ongles, bec	Couleur chair.



# Comparaison entre agate et aminet



**Attention aux tailles intermédiaires.**

## Verdier

# Verdier d'Europe

*(Chloris chloris chloris)*

Mâle



Femelle



# Verdier d'Europe

(*Chloris chloris aurantiiventris*)

## Taille 14 - 16 cm

- couleur verte plus lumineuse que chez chloris chloris
- gorge et face ventrale fortement lavées de jaune
- bec et pattes plus clairs que chez chloris chloris
- plus grand et plus coloré que chloris chloris



Défauts :

- 1) Tête trop plate et trop petite,
- 2) Bosse à la nuque,
- 3) Dessins des joues pas assez visibles,
- 4) Corps pas assez trapu,
- 5) Liseré jaune pas assez vif chez le mâle,
- 6) Dos creux,
- 7) Tache jaune sur le front,
- 8) Couleur trop brune chez les mâles.

## Verdier d'Europe mâle (*Chloris chloris chloris*)

~ Phénotype ancestral ~

Taille du corps : 13/15 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	Large, massive, avec le cou bien rempli. Front vert lumineux. Zone loreale et moustache gris-vert
Joues	Gris cendré.
Gorge, épaules	Vert jaunâtre.
Dos	Vert olive avec reflets brunâtres.
Poitrine, flancs	Vert olive.
Ventre	Gris blanchâtre.
Ailes	Grandes rémiges noir brunâtre avec vexille externe jaune vif. Rémiges secondaires grises avec un liseré noir brunâtre à l'extrémité.
Queue	Rectrices jaunes à la base et noir brunâtre à l'extrémité avec un liseré gris le long du vexille externe. Les deux rectrices médianes sont noir brunâtre. Queue courte avec l'extrémité fourchue.
Yeux	Brun foncé.
Bec	Couleur chair, flammé de brun. Gros et conique.
Pattes, doigts	Couleur chair.
Ongles	Chair foncé.



## Verdier d'Europe femelle (*Chloris chloris chloris*)

~ Phénotype ancestral ~

Taille du corps : 13/15 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	brun grisâtre. Large, massive, avec le cou bien rempli.
Joues	Gris cendré.
Gorge, épaules	Gris-vert.
Dos	brun grisâtre marqué de stries plus foncées.
Poitrine, flancs	brun grisâtre strié.
Ventre	Gris blanchâtre.
Ailes	Grandes rémiges noir brunâtre avec vexille externe jaune. Rémiges secondaires grises avec un liseré noir brunâtre à l'extrémité. Liseré moins large que chez le mâle
Queue	Rectrices jaunes à la base et noir brunâtre à l'extrémité avec un liseré gris le long du vexille externe. Les deux rectrices médianes sont noir brunâtre. Queue courte avec l'extrémité fourchue. Miroir moins large que chez le mâle
Yeux	Brun foncé.
Bec	Couleur chair, flammé de brun. Gros et conique.
Pattes, doigts	Couleur chair.
Ongles	Chair foncé.



## Verdier d'Europe mâle (*Chloris chloris chloris*)

~ Mutation isabelle ~

Taille du corps : 13/15 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	Jaunâtre.
Couronne, joues, moustaches	Beiges.
Gorge	Jaune.
Dos	Jaune avec léger voile beige bien réparti.
Poitrine, flancs	Jaune avec un voile beige.
Ventre	Jaune devenant blanc vers l'anus.
Ailes	Grandes rémiges brunes avec vexille externe jaune et liseré beige à l'extrémité. Rémiges secondaires brunes avec un large liseré beige.
Couvertures	Grandes couvertures beiges. Petites et moyennes couvertures jaunes.
Croupion	Jaune.
Queue	Deux premiers tiers des rectrices jaunes et dernier tiers brun avec liseré beige à l'extrémité sauf pour les deux rectrices médianes qui n'ont pas de jaune.
Yeux	Brun foncé (yeux isabelle).
Bec	Couleur chair.
Pattes, doigts	Couleur chair.
Ongles	Couleur chair.

Remarque : le voile beige est moins visible chez les mâles adultes.

Photo UOF Pierre Malburget



Photo UOF



## Verdier d'Europe femelle (*Chloris chloris chloris*)

~ Mutation isabelle ~

Taille du corps : 13/15 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	Jaunâtre.
Couronne, joues, moustaches	Beiges.
Gorge	Vert jaunâtre.
Dos	Vert jaunâtre avec léger voile beige bien réparti.
Poitrine, flancs	Vert jaunâtre avec un voile beige.
Ventre	Beige clair.
Ailes	Grandes rémiges brun beige avec vexille externe jaune clair et liseré beige clair à l'extrémité. Rémiges secondaires brun beige.
Couvertures	Grandes couvertures brun beige. Petites et moyennes couvertures vert jaunâtre lavé de beige.
Croupion	Vert jaunâtre.
Queue	Deux premiers tiers des rectrices jaune pâle et dernier tiers brun avec liseré beige à l'extrémité sauf pour les deux rectrices médianes qui n'ont pas de jaune.
Yeux	Brun foncé (yeux isabelle).
Bec	Couleur chair.
Pattes, doigts	Couleur chair.
Ongles	Couleur chair.

Remarque : la couleur de fond jaune est plus visible chez les adultes.



## Verdier d'Europe mâle (*Chloris chloris chloris*)

~ Mutation agate ~

Taille du corps : 13/15 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	Vert jaunâtre.
Couronne, joues, moustaches	Gris.
Gorge	Vert jaunâtre.
Dos	Vert avec léger voile gris bien régulier.
Poitrine, flancs	Vert jaunâtre avec un voile gris.
Ventre	Vert jaunâtre.
Ailes	Grandes rémiges gris foncé avec vexille externe jaune et liseré gris clair à l'extrémité. Rémiges secondaires gris foncé avec un large liseré gris clair.
Couvertures	Grandes couvertures gris argenté. Petites et moyennes couvertures vert jaunâtre.
Croupion	Vert jaunâtre.
Queue	Deux premiers tiers des rectrices jaunes et dernier tiers gris foncé avec liseré gris clair sauf pour les deux rectrices médianes qui n'ont pas de jaune.
Yeux	Noirs.
Bec	Couleur chair.
Pattes, doigts	Couleur chair.
Ongles	Couleur chair.

Remarque : le voile gris est moins visible chez les mâles adultes.



Photo UOF p. Malburget

# Verdier d'Europe femelle (*Chloris chloris chloris*)

~ Mutation agate ~

Taille du corps : 13/15 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	Couronne vert jaunâtre striée de gris. Joues vert jaunâtre lavées de gris. Moustaches grises.
Gorge	Gris clair.
Dos	Vert avec dessin strié gris bien visible.
Poitrine, flancs	Gris clair. Poitrine avec dessin strié gris sur les côtés.
Ventre	Gris clair.
Ailes	Grandes rémiges gris foncé avec vexille externe jaune clair et liseré gris clair à l'extrémité. Rémiges secondaires gris foncé avec un large liseré gris brun.
Couvertures	Grandes couvertures gris brun. Petites et moyennes couvertures vert lavé de gris.
Croupion	Vert jaunâtre voilé de gris
Queue	Deux premiers tiers des rectrices jaune clair et dernier tiers gris foncé avec liseré gris clair à l'extrémité sauf pour les deux rectrices médianes qui n'ont pas de jaune.
Yeux	Noirs.
Bec	Couleur chair.
Pattes, doigts	Couleur chair.
Ongles	Couleur chair.

Remarque : la couleur de fond jaune est plus visible chez les adultes.

Photo KBOF



## Verdier d'Europe mâle (*Chloris chloris chloris*)

~ Mutation brun ~

Taille du corps : 13/15 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	Brun jaunâtre avec un voile gris brun sur les joues. Moustaches plus foncées que les joues. Sourcils plus clairs.
Dos	Brun jaunâtre.
Poitrine	Jaune brun.
Flancs	Bruns jaunâtres.
Ventre	Jaunâtre.
Ailes	Grandes rémiges brunes avec vexille externe jaune et liseré beige à l'extrémité. Rémiges secondaires brun grisâtre.
Couvertures	Grandes couvertures brun grisâtre. Petites et moyennes couvertures brun jaunâtre.
Croupion	Olive.
Queue	Deux premiers tiers des rectrices jaunes et dernier tiers brun avec liseré beige sauf pour les deux rectrices médianes qui n'ont pas de jaune.
Yeux	Bruns.
Bec	Couleur chair.
Pattes, doigts	Couleur chair.
Ongles	Couleur chair.

Remarque : les mâles adultes ont une couleur de fond jaune, plus visible sur la poitrine.



## Verdier d'Europe femelle (*Chloris chloris chloris*)

~ Mutation brun ~

Taille du corps : 13/15 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	Brun chaud avec moustaches visibles.
Gorge	brun jaunâtre.
Dos	Brun chaud.
Poitrine	Brune.
Flancs	Brun chaud.
Ventre	Blanc sale.
Ailes	Grandes rémiges brunes avec petit vexille externe jaune et liseré beige à l'extrémité. Rémiges secondaires brunes avec un voile gris.
Couvertures	Grandes couvertures brunes avec un voile gris. Petites et moyennes couvertures brun chaud.
Croupion	Brun jaunâtre.
Queue	Premier tiers des rectrices jaune et deux derniers tiers bruns avec liseré beige à l'extrémité sauf pour les deux rectrices médianes qui n'ont pas de jaune.
Yeux	Bruns.
Bec	Couleur chair.
Pattes, doigts	Couleur chair.
Ongles	Couleur chair.



## Verdier d'Europe mâle (*Chloris chloris chloris*)

~ Mutation satiné ~

Taille du corps : 13/15 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	Jaune.
Couronne, joues	Beige très clair.
Gorge, croupion	Jaune.
Dos	Jaune avec un voile beige très clair, sans stries.
Poitrine	Jaune avec un voile beige très clair sur les côtés.
Flancs	Jaune avec un voile beige très clair.
Ventre	Blanc sale.
Ailes	Grandes rémiges beiges avec vexille externe jaune et liseré beige très clair à l'extrémité. Rémiges secondaires beige clair.
Couvertures	Grandes couvertures beige clair. Petites et moyennes couvertures jaunes.
Queue	Deux premiers tiers des rectrices jaune doré et dernier tiers beige sans liseré sauf pour les deux rectrices médianes qui n'ont pas de jaune.
Yeux	Rouges.
Bec	Couleur chair.
Pattes, doigts	Couleur chair.
Ongles	Couleur chair.

Remarque : les mâles adultes ont une couleur de fond est plus jaune sur la poitrine.

photo FOI



## Verdier d'Europe femelle (*Chloris chloris chloris*)

~ Mutation satiné ~

Taille du corps : 13/15 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	Jaune clair.
Couronne, joues	Beige très clair.
Gorge	Jaune clair.
Dos	Jaune clair avec un voile beige très clair. Présence d'un léger dessin de stries beiges.
Poitrine, flancs	Jaune clair avec un voile beige très clair.
Ventre	Blanc sale.
Ailes	Grandes rémiges beiges avec vexille externe jaune et liseré beige très clair à l'extrémité. Rémiges secondaires beige clair.
Couvertures	Grandes couvertures beige clair avec un voile gris. Petites et moyennes couvertures jaunes voilées de beige.
Croupion	Jaune.
Queue	Deux premiers tiers des rectrices jaunes et dernier tiers beige sans liseré sauf pour les deux rectrices médianes qui n'ont pas de jaune.
Yeux	Rouges.
Bec	Couleur chair.
Pattes, doigts, ongles	Couleur chair.



Photo UOF Pierre Malburget

## Verdier d'Europe mâle (*Chloris chloris chloris*)

~ Mutation lutino ~

Taille du corps : 13/15 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête, gorge, dos, poitrine, flancs	Jaunes.
Ventre	Blanc jaunâtre.
Ailes	Grandes rémiges jaunes avec vexille externe jaune doré et liseré beige très clair à l'extrémité. Rémiges secondaires jaunes.
Couvertures	Jaunes.
Croupion	Jaune doré.
Queue	Jaune avec liseré externe jaune doré.
Yeux	Rouges.
Bec	Couleur chair.
Pattes, doigts, ongles	Couleur chair.



Photo UOF  
Pierre Malburet

## Verdier d'Europe femelle (*Chloris chloris chloris*)

~ Mutation lutino ~

Taille du corps : 13/15 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête, gorge, dos, poitrine, flancs	Blanc jaunâtre.
Ventre	Blanchâtre.
Ailes	Grandes rémiges blanchâtres avec vexille externe jaune. Rémiges secondaires blanchâtres. Epauls jaunes.
Couvertures	Grandes couvertures jaune blanchâtre. Petites et moyennes couvertures blanchâtres.
Croupion	Jaune.
Queue	Blanchâtre avec petit liseré jaune.
Yeux	Rouges.
Bec	Couleur chair.
Pattes, doigts, ongles	Couleur chair.



Photo UOF  
Pierre Malburget

## Verdier d'Europe (*Chloris chloris chloris*)

~ Mutation pastel ~

Taille du corps : 13/15 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	Gris vert avec les moustaches et les joues grisâtres.
Dos, poitrine, flancs	Vert olive avec des reflets gris.
Epaules, gorge	Jaune verdâtre.
Ventre	Gris blanchâtre.
Ailes	Rémiges primaires gris foncé avec vexille externe jaune vif. Rémiges secondaires gris clair avec un liseré gris foncé.
Croupion	Vert olive
Queue	Jaune à la base avec l'extrémité gris clair lavée de jaune. un liseré gris plus foncé entoure les rectrices.
Yeux	Brun foncé.
Bec	Couleur chair, flammé de brun clair.
Pattes, doigts	Couleur chair.
Ongles	Couleur corne.

Dimorphisme sexuel : mêmes caractéristiques que les mâles mais le pigment est plus foncé. Les liserés jaunes des rémiges et des rectrices sont moins larges et plus ternes. Très léger dessin dorsal visible.

Remarque : il faut tenir compte qu'il existe des spécimens schimmel et intensifs. Cette différence est bien marquée.



## Verdier d'Europe mâle (*Chloris chloris chloris*)

~ Mutation agate pastel (dénomination provisoire en étude)~

Taille du corps : 13/15 cm

Zones du plumage	Couleur
Couronne, joues, moustaches	Gris clair. Le reste de la tête est vert jaunâtre.
Dos	Vert olive. Voile gris clair bien régulier.
Gorge, poitrine, flancs, croupion	Jaune verdâtre. Poitrine et flancs avec un léger voile gris.
Ventre	Jaune verdâtre plus clair que la poitrine.
Ailes	Rémiges primaires grises, et jaunes le long du vexille externe avec un liseré gris clair à l'extrémité. Rémiges secondaires grises, avec un large liseré gris très clair.
Couvertures	Grandes couvertures gris argenté clair. Petites et moyennes couvertures jaune verdâtre.
Queue	Deux premiers tiers des rectrices jaunes et dernier tiers gris avec un liseré gris clair sauf pour les deux rectrices médianes qui n'ont pas de jaune.
Yeux	Noirs.
Bec	Couleur chair.
Pattes, doigts	Couleur chair.
Ongles	Couleur corne.



Photo

J.M. Eytorff

## Verdier d'Europe femelle (*Chloris chloris chloris*)

~ Mutation agate pastel (dénomination provisoire en étude) ~

Taille du corps : 13/15 cm

Zones du plumage	Couleur
Couronne	Jaune verdâtre avec des stries gris clair.
Joues	Jaune verdâtre lavées de gris clair.
Moustaches	Gris clair.
Dos	Gris avec un dessin strié de gris clair bien visible.
Gorge, poitrine	Jaune verdâtre pâle avec un voile gris argenté léger.
Flancs	Jaune verdâtre pâle avec un voile gris clair et un léger dessin.
Croupion	Jaune verdâtre.
Ventre	Légèrement plus clair que la poitrine.
Ailes	Rémiges primaires grises, et jaunes le long du vexille externe avec un liseré gris clair à l'extrémité. Rémiges secondaires grises, avec un large liseré gris très clair.
Couvertures	Grandes couvertures gris argenté clair. Petites et moyennes couvertures jaune verdâtre.
Queue	Deux premiers tiers des rectrices jaunes et dernier tiers gris avec un liseré gris clair sauf pour les deux rectrices médianes qui n'ont pas de jaune.
Yeux	Noirs.
Bec, pattes, doigts	Couleur chair.
Ongles	Couleur corne.



photo Philippe ROCHER

Standard COM/OMJ Edition 2014.

Mise à jour partielle CNJF Aout 2022.

## Verdier d'Europe (*Chloris chloris chloris*)

~ Mutation isabelle pastel (dénomination provisoire en étude) ~

Taille du corps : 13/15 cm

Zones du plumage	Couleur
Front, lorums, menton, contours des yeux	Masque jaune
Région auriculaire, vertex	Jaunes avec un léger voile beige clair jusque dans la nuque.
Dos	Jaunes avec un léger voile beige.
Poitrine, flancs, croupion	Jaunes.
Ventre	Blanc sale.
Ailes	Rémiges primaires beiges avec un liseré jaune. Rémiges secondaires beige clair avec un liseré jaune. Couvertures jaunes.
Queue	Beige avec les deux premiers tiers jaunes.
Yeux	Isabelle.
Pattes, doigts, ongles, bec	Couleur chair.

Dimorphisme sexuel : mêmes caractéristiques que les mâles mais le pigment est moins lumineux. Les liserés jaunes des rémiges et des rectrices sont moins larges et plus ternes.

ATTENTION : Risque de confusion avec la variété isabelle satiné



Photo  
J.M. Cytorff

## Verdier d'Europe (*Chloris chloris chloris*)

~ Mutation brun pastel (dénomination provisoire en étude) ~

Taille du corps : 13/15 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	Brun très clair
Région auriculaire, vertex, front, nuque	Brun clair. Masque et sourcils jaune clair chez le mâle
Dos	Jaune clair voilé de brun léger
Gorge, poitrine, flancs	-idem-
Ventre	Beige crème
Ailes	Brun clair avec miroir jaune
Couvertures	Jaune voilé de brun clair
Croupion	Jaune
Queue	Brun clair liseré jaune
Yeux	Brun
Ongles, pattes, doigts, bec	Couleur chair

Dimorphisme sexuel : mêmes caractéristiques que les mâles mais le pigment est plus foncé. Les liserés jaunes des rémiges et des rectrices sont moins larges et plus ternes.

**ATTENTION : Risque de confusion avec la variété isabelle.**



Stand  
Mise

*Verdier d'Europe mâle (Chloris chloris chloris)*

*~ Phénotype ancestral bec jaune ~*

Taille du corps : 13/15 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	Large, massive, avec le cou bien rempli. Front vert lumineux. Zone lorale et moustache gris-vert
Joues	Gris cendré avec incrustations vertes jaunâtres lumineuses.
Gorge, épaules	Vert jaunâtre très lumineux.
Dos	Vert olive avec reflets brunâtres très lumineux.
Poitrine, flancs	Vert olive lumineux.
Ventre	Jaune lumineux.
Ailes	Grandes rémiges noir brunâtre avec vexille externe jaune vif. Rémiges secondaires grises avec un liseré noir brunâtre à l'extrémité.
Queue	Rectrices jaunes à la base et noir brunâtre à l'extrémité avec un liseré gris le long du vexille externe. Les deux rectrices médianes sont noir brunâtre. Queue courte avec l'extrémité fourchue.
Yeux	Brun foncé.
Bec	Couleur jaune doré, flammé de brun. Gros et conique.
Pattes, doigts	Couleur jaune doré. Jaune doré plus foncé sur la partie interne cornée.
Ongles	Jaunes dorés.



Photo JM EYTORFF

Aspect général de l'oiseau très lumineux. Donne une impression de douceur au plumage  
comme chez le Bouvreuil Githagines (*Bucanetes githagineus*)  
En cas d'oiseau schimmel, le givrage blanc est remplacé par du jaune

# *Verdier d'Europe mâle (Chloris chloris chloris)*

~ *Mutation isabelle bec jaune* ~

Taille du corps : 13/15 cm

<b>Zones du plumage</b>	<b>Couleur</b>
<b>Tête</b>	Jaune doré très lumineux
<b>Couronne, joues, moustaches</b>	Beiges sur fond jaune doré lumineux.
<b>Gorge</b>	Jaune doré très lumineux.
<b>Dos</b>	Jaune doré très lumineux avec léger voile beige bien réparti.
<b>Poitrine, flancs</b>	Jaune doré très lumineux avec un voile beige.
<b>Ventre</b>	Jaune doré lumineux jusqu'à l'anus.
<b>Ailes</b>	Grandes rémiges brunes avec vexille externe jaune lumineux et liseré jaune beige à l'extrémité. Rémiges secondaires brunes avec un large liseré jaune doré beige.
<b>Couvertures</b>	Grandes couvertures beiges sur fond jaune doré. Petites et moyennes couvertures jaunes dorées.
<b>Croupion</b>	Jaune doré très lumineux.
<b>Queue</b>	Deux premiers tiers des rectrices jaunes dorés et dernier tiers brun avec liseré beige à l'extrémité
<b>Yeux</b>	Brun foncé (yeux isabelle).
<b>Bec</b>	Couleur jaune doré.
<b>Pattes, doigts</b>	Couleur jaune doré. Jaune plus foncé sur la partie interne cornée
<b>Ongles</b>	Jaunes dorés



**Photos JM EYTORFF**

Remarque : L'Isabelle Bec Jaune ne présente plus de blanc, donnant un aspect jaune doré intensif à l'oiseau. Le voile beige est moins visible chez les mâles adultes.  
En cas d'oiseau schimmel, le givrage blanc est remplacé par du jaune donnant un aspect intensif à l'oiseau.

## *Verdier d'Europe femelle (Chloris chloris chloris)*

*~ Mutation isabelle bec jaune ~*

Taille du corps : 13/15 cm

<b>Zones du plumage</b>	<b>Couleur</b>
<b>Tête</b>	Jaune doré très lumineux avec incrustations beiges
<b>Couronne, joues, moustaches</b>	Beiges sur fond jaune doré lumineux
<b>Gorge</b>	Jaune doré très lumineux.
<b>Dos</b>	Jaune doré lumineux avec léger voile beige bien réparti et dessin striés.
<b>Poitrine, flancs</b>	Jaune doré lumineux avec un voile beige.
<b>Ventre</b>	Jaune doré très lumineux.
<b>Ailes</b>	Grandes rémiges brun beige avec vexille externe jaune doré et liseré beige clair à l'extrémité. Rémiges secondaires brun beige.
<b>Couvertures</b>	Grandes couvertures brun beige sur fond jaune lumineux. Petites et moyennes couvertures jaunes dorées lavé de beige.
<b>Croupion</b>	Jaune doré très lumineux.
<b>Queue</b>	Deux premiers tiers des rectrices jaune doré et dernier tiers brun avec liseré beige à l'extrémité
<b>Yeux</b>	Brun foncé (yeux isabelle).
<b>Bec</b>	Jaune doré.
<b>Pattes, doigts</b>	Couleur jaune doré. Jaune plus foncé sur la partie cornée
<b>Ongles</b>	Jaunes dorés



Photo JM EYTORFF

Remarque : L'apparence de la femelle fait penser à un mâle. Phénotype très différent d'une femelle isabelle classique. L'apparence est celle d'un sujet intensif. Le givrage blanc est remplacé par du jaune.

## *Verdier d'Europe mâle (Chloris chloris chloris)*

~ Mutation agate bec jaune ~

Taille du corps : 13/15 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	Vert jaune très lumineux.
Couronne, joues, moustaches	Gris sur fond vert jaune très lumineux.
Gorge	Vert jaune très lumineux.
Dos	Vert jaune très lumineux avec léger voile gris bien régulier.
Poitrine, flancs	Vert jaune très lumineux avec un voile gris.
Ventre	Vert jaune très lumineux.
Ailes	Grandes rémiges gris foncé avec vexille externe jaune lumineux et liseré gris clair à l'extrémité. Rémiges secondaires gris foncé avec un large liseré gris clair.
Couvertures	Grandes couvertures vert jaune. Petites et moyennes couvertures vert jaune lumineux.
Croupion	Vert jaune lumineux.
Queue	Deux premiers tiers des rectrices jaunes intense et dernier tiers gris foncé avec liseré gris clair
Yeux	Noirs.
Bec	Jaune doré.
Pattes, doigts	Couleur jaune doré. Jaune plus foncé sur la partie cornée
Ongles	Jaune doré.



Photo JM Eytorff

Remarque : Le mâle Agate bec jaune à l'apparence d'un oiseau intensif.  
Plus de traces de blanc remplacées par du jaune verdâtre ou du jaune gris est moins visible chez les mâles adultes.

## *Verdier d'Europe femelle (Chloris chloris chloris)*

~ Mutation agate bec jaune ~

Taille du corps : 13/15 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	Couronne vert jaune lumineux striée de gris. Joues vert jaune très lumineux lavées de gris. Moustaches grises sur fond vert jaune très lumineux.
Gorge	Vert jaune très lumineux .
Dos	Vert jaune lumineux avec dessin strié gris bien visible.
Poitrine, flancs	Vert jaune très lumineux avec un voile gris .
Ventre	Vert jaune très lumineux .
Ailes	Grandes rémiges gris foncé avec vexille externe jaune et liseré gris clair à l'extrémité. Rémiges secondaires gris foncé avec un large liseré gris brun.
Couvertures	Grandes couvertures gris brun. Petites et moyennes couvertures vert jaune lumineux lavé de gris.
Croupion	Vert jaune lumineux voilé de gris
Queue	Deux premiers tiers des rectrices jaune intense et dernier tiers gris foncé avec liseré gris clair
Yeux	Noirs.
Bec	Jaune doré..
Pattes, doigts	Couleur jaune doré. Jaune plus foncé sur la partie cornée .
Ongles	Jaune doré .

### Remarque :

L'apparence de la femelle fait penser à un mâle. Phénotype très différent d'une femelle Agate classique. L'apparence est celle d'un sujet intensif. le givrage blanc est remplacé par du jaune

**Le verdier Maltais.**



# Verdier Major

## Standards d'exposition

### O.M.J.-C.O.M.

#### TAILLE:

Aussi grand que possible, minimum 16.5cm.

#### TYPE:

##### Bec;

Le bec doit compléter la forme de la tête.

##### Tête;

Une tête large, bien arrondie et bien élevée, un front bien visible, un cou bien rempli.

##### Corp;

De profil, l'oiseau doit présenter une rondeur harmonieuse partant au-dessous de la gorge jusqu'au bas ventre. De même, on cherche une courbe convexe de la base du cou au croupion. Devrait se tenir bien relevé sur le perchoir à un angle de 45° approximativement.

##### Cuisses;

Pas visibles.

##### Ailes;

Serrées contre le corps, couvrant les sus-caudales. Ne doivent pas se croiser ou pendre.

##### Queue;

Relativement court, serré et distinctement fourchu.

#### COULEURS ET MARQUES:

##### MÂLES:

##### Bec;

Couleur chair clair.

##### Yeux;

Brun foncé.

##### Tête;

Un front vert, les lores foncés.

La raie sourcilière d'un vert plus clair.

La calotte et la nuque brun-verdâtre.

La moustache doit être plus foncée et bien évidente. La plage auriculaire grise.

##### Dos;

Brun verdâtre avec des marques brunes plus foncées.

##### Croupion;

Vert, sans contraste avec le manteau.

Les sus-caudales doivent aller d'un vert olive à un brun grisâtre progressivement.

##### Bas ventre;

La gorge et la poitrine doivent être d'un vert riche et lumineux, aussi clair et solide que possible, se fondant dans le jaune du ventre, le blanc du bas ventre restant au minimum.

Les sous caudales jaunes se fondent dans un vert olive progressivement.

##### Flancs;

Brun verdâtre.

##### Ailes;

• Les scapulaires – vert brun se mariant au manteau.

• Les rémiges primaires – doivent montrer des barres jaune riche, formant une longue marque sur l'extrémité inférieure de l'aile repliée.

• Les rémiges secondaires – noires avec des bordures grises, plus larges et brunâtres sur les tertiaires.

• Les petites sus-alaires – vertes.

• Les moyennes sus-alaires – vert olive.

• Les tectrices primaires – un gris brunâtre.

• L'alule – jaune vif.

##### Queue:

Noire montrant des tâches jaunes vif et une frange extérieure grise.

Les plumes du centre de la queue seront noires avec une bordure verte.

##### Pattes et doigts;

Couleur chair.

##### Ongles;

Couleur chair foncée.

#### LES FEMELLES:

##### Type;

Comme pour le mâle

##### Couleur;

Des teintes brunâtres et verdâtres vifs. Le jaune des ailes et de la queue ne sera pas aussi étendu que pour le mâle.

##### Bec;

Comme pour le mâle

##### Yeux;

Comme pour le mâle

##### Tête;

Le front brun teinté de vert.

Le supercilium plus clair.

La calotte et la nuque brunes avec des marques plus foncées.

La moustache, d'un brun plus foncé, doit être bien visible.

La plage auriculaire grise.

##### Dos;

Brun avec des marques plus foncées. Les marques sur le dos doivent être alignés, se rétrécissant vers la tête et allant jusqu'au croupion.

##### Croupion;

Vert, les sus-caudales vert olive vers le brun.

##### Bas ventre;

La gorge brun grisâtre avec une teinte verte.

La poitrine doit être un brun clair avec une teinte verte avec des marques plus foncées.

Les marques sur la poitrine sont plus larges et moins évidentes.

Le ventre est vert allant vers le blanc autour du bas ventre.

Les sous caudales grises avec une légère teinte brune.

##### Flancs;

Bruns

#### Ailes;

- Les scapulaires – brunes.
- Les rémiges primaires – brun noirâtre. Une bordure jaune, plus mince et moins vive que chez le mâle.
- Les rémiges secondaires – brun noiâtre avec des bordures brun grisâtres.
- Les petites sus-alaires – vert olive.
- Les moyennes sus-alaires – vert olive à brun.
- Les tectrices primaires – noires avec une bordure verte.
- L'alule – brun noirâtre avec une bordure jaune.

#### La queue;

Noire avec une bordure extérieure jaune. Les plumes du centre de la queue seront brun noirâtre.

#### Pattes et doigts;

Couleur chair.

#### Ongles;

Couleur chair foncée.

#### NOTE

##### Note sur la Taille:

Même si l'on préfère des exemplaires plus grands, la taille ne devrait pas nuire à la qualité de la couleur et de la forme.

Si le standard encourage la plus grande taille possible, la sélection pourrait mener à la présence de nombreux défauts : le plumage, une fertilité diminuée, une immunité affaiblie. Aucun aviculteur de devrait contempler la perpétuation de tels défauts par l'élevage d'oiseaux portant ces traits.

##### Note sur le Type:

La tête ne devrait pas être angulaire ou « en forme de boîte ». Le front doit être bien marqué, avec une bonne montée à partir de la mandibule supérieure donnant un front bien marqué. Le crâne devrait être large dans sa rondeur supérieure ainsi que vers le cou.

Le corps doit être compact et rond donnant une apparence robuste et arrondie.

##### Note sur la Couleurs et les Marques :

Mâle;

Des teintes brunâtres sur la tête, le dos et les flancs ne seront pas considérées fautives, mais l'oiseau qui présente un vert plus vif sera considéré supérieur.

Les oiseaux schimmel montrent moins de couleur que les intensifs. Il est donc moins facile pour un schimmel de gagner par rapport aux meilleurs intensifs que s'il s'agit d'un schimmel qui gagne à force d'une supériorité de type et de taille.

##### Note sur les Couleurs et Marques :

Femelles ;

Le blanc autour du bas ventre est plus étendu par rapport à celui du mâle, s'étendant souvent sur le ventre.

Les femelles bien jaunes montreront beaucoup de couleur sur le poitrail et ceci, associé à de bonnes performances sur le plan taille et type, devrait aboutir à des succès. Des femelles schimmel feront souvent mieux que des jaunes

dans leur classe mais seront battus par un coq jaune quand il s'agit d'une concurrence pour le Meilleur Verdier.

#### Notes générales:

L'oiseau doit montrer une certaine fierté et se tenir bien résolument sur son perchoir, regardant fixement ses spectateurs.

Au cas où les intensifs et les schimmel sont jugés de mérite pareil, le jaune gagne le jour. Si, pourtant, le schimmel déjà bien coloré est supérieur comme type, il prend la préférence.

#### DÉFAUTS

##### Défauts du Type:

Un crâne étroit. Des yeux mal placés. Un bec trop grand ou trop petit.

À éviter surtout un oiseau qui présente l'apparence d'une ligne droite du haut de la tête jusqu'à la queue, forme qu'on compare à « une piste de ski » où l'oiseau est « long ». Cette ligne droite ne peut jamais permettre la forme arrondie qu'on cherche dans cet oiseau. Pire encore : un dos creux.

Déformités, oiseau en forme de poire, un surpoids sur la poitrine ou dans le bas-ventre dont le résultat est une mauvaise posture. L'oiseau ne devrait pas se tenir couché ou accroupi sur le perchoir.

Mauvais port des ailes.

##### Défauts des couleurs et marques :

Mâle;

Des impuretés de couleur : une discoloration ou une présence trop forte de gris, laissant une apparence trop foncée.


Une présence de brun sur le poitrail et le ventre.

##### Défauts chez les Femelles :

Un blanc trop étendu donnant l'impression d'un oiseau pâle.

##### Défauts généraux :

Un oiseau qui se présente faiblement, peu dressé, pas confiant.



## Bouvrenils

# Bouvreuril pivoine

(*Pyrrhula pyrrhula europaea*)


Taille 15cm

Male

Sans trace de rouge  
Sur le dos



Femelle



# Bouvreuil pivoine (ponceau)

*(pyrrhula pyrrhula pyrrhula)*

**Taille 18 cm,**

- Moins coloré qu'europeaea
- Sans trace de rouge sur le dos
- Présence de lunules de queue



**Standard COM/OMJ Edition 2014.  
Mise à jour partielle CNJF Aout 2022.**

# Bouvreuil pivoine (ibère)

*(pyrrhula pyrrhula iberiae)*

**Taille 13,5 cm,**

- plus coloré que les deux autres sous-espèces
- peut présenter des traces rouges sur le manteau



# Bouvreuil pivoine (ibère)

*(pyrrhula pyrrhula iberiae)*



## Bouvreuil pivoine (*Pyrrhula pyrrhula*)

~ Phénotype ancestral ~

Taille du corps : 13,5 cm pour le Bouvreuil pivoine  
18 cm pour le Bouvreuil ponceau

Zones du plumage	Couleur
Tête	Calotte et contours du bec noirs. Nuque courte et bien remplie.
Dos, épaules	Gris bleuâtre. Sans trace de rouge, sauf <i>ssp iberiae</i>
Gorge, poitrine, flancs	Couleur rouge régulièrement répartie et délimitée par la calotte noire en-dessous des yeux.
Abdomen, sous-caudales	Blancs.
Rémiges	Rémiges primaires et secondaires noires à reflets bleuâtres. Bande alaire gris blanc qui part du bord externe de l'aile et s'élargit vers le dos. Deux petites plumules rouges garnissent l'extrémité des rémiges tertiaires.
Croupion	Blanc.
Queue	Noir brillant.
Yeux	Noirs.
Bec	Noir, court et très bombé avec extrémité de la mandibule supérieure légèrement courbée.
Pattes, doigts, ongles	Noirs.

Dimorphisme sexuel : mêmes caractéristiques que le mâle avec les couleurs plus ternes.

De plus, chez la femelle, le dos est gris brunâtre et la poitrine est gris brunâtre teinté de beige.

Défauts :

- 1) Calotte dentelée dans la nuque,
- 2) Bavette irrégulière sous le menton,
- 3) Reflets blanchâtres en dessous des yeux,
- 4) Couleur de la poitrine irrégulière,
- 5) Barre alaire n'allant pas jusqu'au bord de l'aile ou irrégulière,
- 6) Plumes rouges du dos absentes,
- 7) Creux dans la nuque,
- 8) Cassure à la nuque,
- 9) Trop étroit des épaules,

### 10) Attention aux tailles intermédiaires.

Couleur = Tête / Rémiges / Rectrices secondaires de la même couleur et présence de la flamme rouge chez les mâles et les femelles.

La présence de lunules de queue chez le Bouvreuil Ponceau n'est pas fautive



Photo Philippe ROCHER



# Bouvreuil pivoine

~ Mutation pastel ~

Taille du corps : 13,5 cm pour le Bouvreuil pivoine  
18 cm pour le Bouvreuil ponceau

Zones du plumage	Couleur
Tête	Calotte brun noirâtre. Joes de couleur rosée.
Dos, épaules	Gris pastel (gris beige).
Poitrine	Rose.
Abdomen, sous-caudales	Blancs.
Rémiges	Rémiges primaires et secondaires gris foncé. Barre alaire gris beige clair. Taches roses sur des rémiges tertiaires.
Croupion	Blanc.
Queue	Gris foncé avec sus-caudales plus claires.
Yeux	Brun foncé.
Bec	Brun noirâtre.
Pattes, doigts	Brun foncé.
Ongles	Foncés.

Dimorphisme sexuel : mêmes caractéristiques que le mâle avec les couleurs du manteau et de la poitrine beige clair.



Photo UOFChartier



# Bouvreuil pivoine mâle

~ Mutation brun ~

Taille du corps : 13,5 cm pour le Bouvreuil pivoine  
18 cm pour le Bouvreuil ponceau

Zones du plumage	Couleur
Tête	Calotte brun très foncé tirant sur le noir.
Dos	Gris clair avec reflets beiges.
Epaules	Gris clair.
Poitrine, gorge, flancs	Roses.
Ventre	Tirant sur le blanc.
Rémiges	Rémiges primaires brunes. Rémiges secondaires brun très foncé tirant sur le noir. Barre alaire gris clair.
Couvertures	Brun très foncé tirant sur le noir.
Croupion	Blanc.
Queue	Brun très foncé avec reflets métalliques.
Yeux	Brun foncé.
Bec	Mandibule supérieure brune. Mandibule inférieure couleur chair.
Pattes, doigts	Brun très clair.
Ongles	Bruns.

Remarque : les retrices ont leur partie externe brun très foncé à reflets métalliques et leur partie interne brune, sauf pour les deux médianes entièrement brun foncé à reflets métalliques. Vue de dessous, la queue apparaît brune.

Photo Philippe ROCHER



# Bouvreuil pivoine femelle

~ Mutation brun ~

**Taille du corps** : 13,5 cm pour le Bouvreuil pivoine  
18 cm pour le Bouvreuil ponceau

Zones du plumage	Couleur
Tête	Calotte brun foncé tirant sur le noir. Joues beige brun.
Dos	Beige brun lavé de gris.
Epaules	Beige brun lavé de gris.
Poitrine, gorge, flancs	Beige brun très uniforme.
Ventre	Clair, tirant sur le blanc.
Rémiges	Rémiges primaires brunes. Rémiges secondaires brun très foncé tirant sur le noir. Barre alaire gris beige.
Couvertures	Brun très foncé tirant sur le noir.
Croupion	Blanc.
Queue	Brun très foncé avec reflets métalliques.
Yeux	Brun foncé.
Bec	Mandibule supérieure brune. Mandibule inférieure couleur chair.
Pattes, doigts	Brun très clair.
Ongles	Bruns.



Photo Driemans

# Bouvreuil pivoine mâle

~ Mutation brun pastel ~

Taille du corps : 13,5 cm pour le Bouvreuil pivoine  
18 cm pour le Bouvreuil ponceau

Zones du plumage	Couleur
Front, calotte, nuque, lorums, menton	Brun noisette chaud. léger voile rouge au vertex toléré
Dos	Gris beige très clair.
Poitrine, gorge, flancs	Rouge rose.
Ventre	Région anale blanche.
Rémiges	Rémiges primaires beige clair. Rémiges secondaires et tertiaires brun beige. Bande alaire claire.
Croupion	Blanc.
Queue	Brun beige.
Yeux	Brun foncé.
Bec	Couleur chair.
Pattes, doigts	Couleur chair.
Ongles	Bruns.



# Bouvreuil pivoine femelle

~ Mutation brun pastel ~

Taille du corps : 13,5 cm pour le Bouvreuil pivoine  
18 cm pour le Bouvreuil ponceau

Zones du plumage	Couleur
Front, calotte, nuque, lorums, menton	Brun noisette chaud.
Dos	Beige.
Poitrine, gorge, flancs	Beige clair soutenu avec un peu de brun.
Ventre	Région anale blanche.
Rémiges	Rémiges primaires beige clair. Rémiges secondaires et tertiaires brun beige. Bande alaire claire.
Croupion	Blanc.
Queue	Brun beige.
Yeux	Brun foncé.
Bec	Couleur chair.
Pattes, doigts	Couleur chair.
Ongles	Bruns.




# Bouvreuil pivoine

~ Mutation blanc ~

Taille du corps : 13,5 cm pour le Bouvreuil pivoine  
18 cm pour le Bouvreuil ponceau

Zones du plumage	Couleur
Tête	blanche
Dos, épaules	blanc.
Gorge, poitrine, flancs	Chez le mâle rose saumon clair Chez la femelle blanche.
Abdomen, sous-caudales	Blancs.
Ailes	rémyges blanches deux couvertures rose saumon
Croupion	Blanc.
Queue	blanche.
Yeux	Noirs.
Bec	Couleur chair
Ventre	blanc
Pattes, doigts,	Couleur chair
ongles	blancs.

DEFAUTS ; traces de couleur sur le dos



**Standard COM/OMJ Edition 2014.**  
**Mise à jour partielle CNJF Aout 2022.**

Photo RBOF

# Bouvreuil pivoine

~ Mutation jaune ~

**Taille du corps** : 13,5 cm pour le Bouvreuil pivoine  
18 cm pour le Bouvreuil ponceau

Zones du plumage	Couleur
Calotte et tour du bec	Noirs jusqu'en dessous des yeux.
Dos, épaules	Gris bleuâtre.
Poitrine, gorge, flancs	Couleur jaune verdâtre régulièrement répartie.
Bas de l'abdomen, sous-caudales, croupion	Blancs.
Ailes	Rémiges primaires et secondaires noires à reflets bleuâtres. Bande alaire gris blanc à partir du bord externe de l'aile en s'élargissant vers le dos. Deux plumules rouges à l'extrémité des rémiges tertiaires.
Queue	Rectrices noir brillant.
Yeux	Noirs.
Bec	Noir, court et très bombé avec l'extrémité de la mandibule supérieure légèrement courbée.
Ongles, pattes, doigts	Noirs.

**Dimorphisme sexuel** : la femelle a les mêmes caractéristiques que le mâle mais les couleurs sont plus ternes.

**Remarque** : cette mutation a été combinée aux autres variétés existantes.




Photo Driesmans

## **Bouvreuil pivoine**

~ Mutation brun pastel jaune ~

Taille du corps : 13,5 cm pour le Bouvreuil pivoine  
18 cm pour le Bouvreuil ponceau

Même caractéristique que le brun pastel mais avec la face ventrale  
jaune



# Bouvreuil pivoine mâle

~ Mutation topaze ~

**Taille du corps** : 13,5 cm pour le Bouvreuil pivoine  
18 cm pour le Bouvreuil ponceau

zone du plumage	Couleur
bec	Couleur corne, court et massif
yeux	Rouge foncé.
tête	Calotte : gris foncé avec un minimum de rouge dans la calotte. Joues : orange rouge
dos	Gris bleu clair sans voile rouge
poitrine, flancs, gorge	Orange rouge.
ventre	Orange rouge, blanc dans la partie inférieure
ails	Gris foncé, bien réparti avec une barre alaire plus claire partant du bord de l'aile. Flamme sur la dernière rémige tertiaire
queue et croupion	Gris foncé en harmonie avec les rémiges Croupion blanc
pattes & doigts	Couleur chair
ongles	corne

Les variétés pastel topaze et brun topaze sont en étude



Standard COM/OMJ Edition 2014.  
Mise à jour partielle CNJF Aout 2022.

# Bouvreuil pivoine femelle

~ Mutation topaze ~

Taille du corps : 13,5 cm pour le Bouvreuil pivoine  
18 cm pour le Bouvreuil ponceau

Zone du plumage	Couleur
Bec	Couleur corne, court et massif
Yeux	Rouge foncé.
Tete	Calotte : gris foncé. Joues : gris brun clair
Dos	Gris-brun foncé sans voile rouge.
Poitrine	Gris brun clair.
Flancs	De même couleur que la poitrine
Ventre	Gris brun clair, blanc dans la partie inférieure
Ailes	Gris foncé, bien réparti avec une barre alaire plus claire partant du bord de l'aile. Flamme sur la dernière rémige tertiaire
Queue & croupion	Gris en harmonie avec les rémiges Croupion blanc
Pattes & doigts	Couleur chair
Ongles	corne




## Gros bec


# Gros bec casse-noyaux

(*Coccothraustes coccothraustes*)

Mâle



Femelle



# Gros bec casse-noyaux mâle (*Coccothraustes coccothraustes*)

~ Phénotype ancestral ~

Taille du corps : 18cm

Zone du plumage	Couleur
Bec	En hiver : de couleur corne pâle. En été : de couleur bleu acier
Yeux	Gris brunâtre. Cercles oculaires : brun rougeâtre.
Tete	Le dessus de la tête est brun. Clair sur le front et foncé sur l'occiput Le liseré frontal, les lorums, le menton et le tour du bec sont noirs La région auriculaire et les joues sont de couleur brun jaunâtre. Le bas des joues et les parties inférieures du cou sont de couleur gris clair.
Dos	Le dos, le manteau et les scapulaires sont de couleur brun foncé. Le bas du dos est brun grisâtre. Le croupion et les sus caudaux sont de couleur brun jaunâtre.
Gorge	Menton et gorge : noir avec un léger liseré très pâle autour de la bavette (le minimum sera le meilleur).
Poitrine	Gris brunâtre, pâle lavé de rose.
Flancs	Brun grisâtre, plus foncés que la poitrine.
Ventre	Gris blanchâtre avec le sous caudale blanc.
Ailes	Les rémiges primaires et secondaires sont noires avec des reflets métalliques. L'extrémité des rémiges primaires internes et des rémiges secondaires externes sont en forme de faucille. Les grandes couvertures alaires sont blanches et forment une barre alaire.
Queue	Courte. Les rectrices médianes sont rousses et les rectrices externes sont noires avec une extrémité blanche. Ceci forme une bande blanche à l'extrémité de la queue.
PATTES et DOIGTS	De couleur brun chair.
Ongles	Brun foncé.

Défauts :

- 1) Bavette irrégulière,
- 2) Couvertures des ailes irrégulières et incomplètes,
- 3) Couleur de la poitrine marbrée,
- 4) Flancs trop clairs,
- 5) Bord du collier gris irrégulier,
- 6) Cercle oculaire incomplet,
- 7) Bec écaillé,
- 8) Faucilles à l'extrémité des rémiges irrégulières,
- 9) Blessures au front.

Photo  
Philippe ROCHER



Plumage nuptial



## Gros bec casse - noyaux femelle (*Coccothraustes coccothraustes*)

~ Phénotype ancestral ~

Taille du corps : 18cm

La femelle a les mêmes caractéristiques que le mâle, mais les teintes sont plus pâles et plus grises.

L'extrémité de la queue de la femelle est moins blanche que chez du mâle.

**Photo UOF P. Malburet**



## Roselins


# Roselin githagine

(*Rhodopechys githaginea*)

Mâle plumage nuptial



Femelle



## Roselin githagine (*Rhodopechys githaginea*)

~ Phénotype ancestral ~

Taille du corps : 12,5cm

Zone du plumage	Couleur
Bec	Orangé, court, puissant, assez large à la base.
Yeux	Noir.
Tête	Assez étroite, faiblement arrondie, de forme élégante. Cou : assez long. Nuque : marquée Couleur de la tête : gris-argenté.
Dos	Gris-brunâtre.
Poitrine	Gris, avec léger reflet rose lie de vin.
Flancs	Du même gris que la poitrine.
Ventre	Comme la poitrine, sauf la zone anale est gris clair.
Ailes	Longues et fines. Rémiges primaires : gris foncé Rémiges secondaires : gris-brun Couvertures : gris-brun Le vexille externe des rémiges et des couvertures portant un étroit liseré clair
Queue	De longueur moyenne, légèrement échancrée. Rectrices : gris foncé, bordées d'un liseré clair
Pattes	Assez longues, fines et de couleur chair.
Doigts	Couleur chair.
Ongles	Gris-beige.
Forme generale	Oiseau de forme élégante et fine.

**La femelle est plus terne et le bec est plus clair**

Défauts :

- 1) Plumage désordonné,
- 2) Ailes croisées ou pendantes,
- 3) Queue étalée.

Mâle plumage hivernal



## Roselin cramoisi mâle (*Carpodacus erythrinus*) ~ Phénotype ancestral ~

Taille du corps : 14,5cm

ZONE DU PLUMAGE	Couleur
Bec	Brun.
Yeux	Brun.
Tête	Couronne et nuque : ➤ Rouge carmin Joues : ➤ Brunnes avec un voile rose
Dos	Brun voilé de rose.
Gorge	Rouge carmin
Poitrine	Rouge carmin se transformant en rouge rose vers le ventre
Flancs	Rouge rose.
Ventre	beige.
Ailes	Grandes rémiges : ➤ Brunnes foncées avec un liseré rose Rémiges secondaires : ➤ Brunnes foncées Petites couvertures : ➤ Brunnes foncées avec un liseré rose
Croupion	Rouge carmin
Queue	Brune avec vexille externe rougeâtre.
Pattes	brunes.
Doigts	bruns.
Ongles	brun



## Roselin cramoisi femelle (*Carpodacus erythrinus*) ~ Phénotype ancestral ~

Taille du corps : 14,5cm

ZONE DU PLUMAGE	Couleur
<b>Bec</b>	Brun.
<b>Yeux</b>	Brun.
<b>Tête</b>	<p>Couronne et nuque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Brun et strié</li> </ul> <p>Joues :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Brunnes beiges</li> </ul>
<b>Dos</b>	Brun et strié.
<b>Gorge</b>	beige
<b>Poitrine</b>	Beige strié de brun
<b>Flancs</b>	Beige strié de brun
<b>Ventre</b>	beige.
<b>Ailes</b>	<p>Grandes rémiges :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Brunnes foncées avec le vexille externe beige</li> </ul> <p>Rémiges secondaires :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Brunnes foncées</li> </ul> <p>Petites couvertures :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Brunnes foncées avec un liseré beige</li> </ul>
<b>Croupion</b>	Vert jaune
<b>Queue</b>	Brunne avec vexille externe vert.
<b>Pattes</b>	brunes.
<b>Doigts</b>	bruns.
<b>Ongles</b>	brun




➤ **Durbec**


# Durbec des sapins

*(Pinicola enucleator)*

Mâle adulte



Femelle





Mâle 1<sup>ère</sup> année



## Durbec des sapins mâle (*Pinicola enucleator*) ~ Phénotype ancestral ~

Taille du corps : 20cm

Zone du plumage	Couleur
Bec	Gris noir, puissant. Mandibule supérieure bombée. L'extrémité courbée vers le bas en forme de croc
Yeux	Noir.
Tête	Assez étroite et plate, rose carmin, reflets gris noirâtre sur la zone loreale et oculaire.
Cou	Encolure large et puissante, nuque peu marquée, rose carmin.
Dos	Large, rose carmin, marqué d'un écaillage gris noirâtre très régulier.
GORGE et POITRINE	Entièrement rose carmin.
Flancs	Etroite bande gris léger soulignant l'aile.
Ventre	Le rose de la poitrine se dégrade en gris blanchâtre, plus clair sur la zone anale.
Ailes	Rémiges primaires : noirâtres, portant un fin liseré gris sur le vexille Rémiges secondaires : noirâtres, largement liserées de blanc, surtout vers l'extrémité Couvertures : noires avec bordure blanche, formant une double barre alaire très distincte.
Croupion	Rose carmin.
Queue	Assez longue et échancrée. Rectrices : noirâtres, portant un très faible liseré gris brun.
PATTES et DOIGTS	Gris-noir.
Ongles	Gris-noir.

**La couleur rose carmin ne s'exprime qu'à partir de la 2ème année.**

**En première année la couleur est orange plus ou moins intense**

Photo mâle adulte



Photo Philippe ROCHER

**Durbec des sapins femelle (*Pinicola enucleator*)**  
**~ Phénotype ancestral ~**

Taille du corps : 20cm

Les teintes sont plus ternes et le rose carmin est remplacé par un ton gris jaunâtre selon les individus.  
Le croupion est gris.




## Bec-croisé

### Remarque:

*En première année la couleur des jeunes mâles peut être moins intensive*

## Bec-croisé des sapins

*(Loxia curvirostra)*



## Bec-croisé des sapins mâle (*Loxia curvirostra*) ~ Phénotype ancestral ~

Taille du corps : 16.5cm

Zone du plumage	Couleur
Bec	Brun gris foncé et croisé complètement. Racine de la mandibule inférieure plus claire. Les mandibules peuvent croisées d'un côté ou l'autre du bec.
Yeux	Brun foncé.
Tête	Front, vertex et nuque : sont rouge plus ou moins intensif. Certains bec-croisé possèdent un dessin écaillé sur le vertex alors que d'autres ont le vertex de couleur uniforme (les deux sont valables). Dessin en forme de fer à cheval brunâtre sur les joues. Lorums et régions auriculaires : brun foncé nuancé de rose. Bas de la nuque moins rouge et plutôt brunâtre.
Dos	Manteau et scapulaires : moins rouge que la poitrine mais plutôt rouge brunâtre.
Poitrine	Brun rougeâtre.
Flancs	Brun rougeâtre.
Ventre	Blanc grisâtre ainsi que la région anale.
Ailes	Rémiges primaires : de couleur noir brunâtre avec un étroit liseré rouge brunâtre le long du vexille externe. Le bout des rémiges possède un bord grisâtre. Couvertures sus alaires de couleur brun foncé. Les petites et les moyennes couvertures sus alaires ont un bord rougeâtre.
Queue	Rectrices : de couleur noir brunâtre avec un étroit liseré rougeâtre ou Sous-caudale : grisâtre avec un dessin écaillé (forme de V).
PATTES et DOIGTS	brun foncé.
Ongles	Noir.

Défauts :

- 1) Couleur de la poitrine irrégulière,
- 2) Extrémité du bec cassé,
- 3) Dessin du sous-caudale irrégulier,
- 4) Dessin des joues irrégulier,
- 5) Couleur d'ensemble tachetée,
- 6) Stries entrecoupée surtout chez la femelle.



## Bec-croisé des sapins femelle (*Loxia curvirostra*)

~ Phénotype ancestral ~

Taille du corps : 16.5cm

La femelle possède les mêmes marques que le mâle, mais la couleur de presque toutes les parties du corps est vert olive grisâtre.

La femelle est plus striée de brun dans l'ensemble que le mâle, notamment sur la tête, la poitrine, le dos et les flancs. Le croupion est jaune verdâtre.


La femelle possède un dessin frontal typiquement gris clair.



Photo P. Malburet

# Bec-croisé bifascié

*(Loxia leucoptera bifasciata)*



## Bec-croisé bifascié mâle (*Loxia leucoptera*)

~ Phénotype ancestral ~

Taille du corps : 14.5cm

Zone du plumage	Couleur
Bec	Couleur corne, assez long. Les mandibules se croisent à l'extrémité de façon très distincte
Yeux	Noir.
Tete	Entièrement rouge carmin, légèrement écaillée avec la zone loreale et le dessin des joues gris. Le sommet du crâne et la nuque portent une légère suffusion grise
Dos	Rouge carmin, voilé de gris et faiblement écaillé.
GORGE et POITRINE	Rouge carmin.
Flancs	Rouge carmin indistinctement lavé de gris.
Ventre	Rouge carmin, se dégradant en blanc sale sur la zone anale.
Ailes	Rémiges : noires, liserées de blanc. Les rémiges secondaires externes sont plus largement liserées, surtout à leur extrémité. Couvertures : noires avec une nette bordure blanche, qui dessine une double barre alaire très nette.
Croupion	Rouge carmin, légèrement écaillé sur son pourtour.
Sous-caudale	Porte un dessin écaillé typique, qui doit être régulier.
Queue	Assez courte, légèrement échancrée. Rectrices : noires, très finement liserées de grisâtre
Pattes	Gris brun. Robustes et assez courtes.
Doigts	Gris brun.
Ongles	Couleur corne.

Photo Philippe ROCHER



## Bec-croisé bifascié femelle (*Loxia leucoptera*)


~ Phénotype ancestral ~

Taille du corps : 14.5cm

La femelle possède les mêmes marques que le mâle, mais la couleur de presque toutes les parties du corps est vert olive grisâtre.

La femelle est plus striée de brun dans l'ensemble que le mâle, notamment sur la tête, la poitrine, le dos et les flancs. Le croupion est jaune verdâtre.


La femelle possède un dessin frontal typiquement gris clair.



# Bec-croisé perroquet

(*Loxia pytyopsittacus*)

Mâle



Mâle  
*Loxia scotica*



## Bec-croisé perroquet mâle (*Loxia pytyopsittacus*)

~ Phénotype ancestral ~

Taille du corps : 17cm

Zone du plumage	Couleur
Bec	Couleur corne, puissant, de forme assez lourde. Les extrémités des mandibules se croisent de façon plus courte que chez le bec croisé des sapins
Yeux	Noir.
Tête	Large, puissamment enchâssée dans les épaules. Front et vertex : de rouge carmin à rouge brique. Lorums et nuque : voilés de brun. Dessin des joues : brun.
Dos	Rouge, fortement mêlé de brun et portant un léger dessin écaillé.
Gorge	Rouge carmin à rouge brique uni.
Poitrine	Rouge plus ou moins voilé de brun.
Flancs	Rouge brunâtre.
Ventre	Blanc grisâtre, légèrement strié sur les côtés.
Ailes	Rémiges : brun noirâtre, portant un étroit liseré plus clair. Grandes couvertures : bordées de brun rougeâtre.
Croupion	Rouge carmin à rouge brique.
Sous-caudale	Porte un dessin écaillé typique qui doit être régulier.
Queue	Courte, échancrée. Rectrices : brun noirâtre, étroitement bordées de brun.
Pattes	Couleur corne, courtes et robustes.
Doigts	Couleur corne.
Ongles	Brun noir.

Défauts :

- 1) Manque d'uniformité dans la couleur,
- 2) Bec défectueux,
- 3) Stries trop fondues ou irrégulières chez la femelle.



## Bec-croisé perroquet femelle (*Loxia pytyopsittacus*)

~ Phénotype ancestral ~

Taille du corps : 17 cm

La femelle présente le même dessin que le mâle.

Le rouge est remplacé par une teinte brun olive plus lumineuse à la poitrine et au croupion.

Les stries sont plus marquées.



## 16. Emberizidae :

La majorité diffèrent de la plupart des fringilles et moineaux par ; tête plus petite, bec conique, queue plus longue et peu fourchue. Chant plutôt médiocre.

### *Bruants*

#### **Bruant fou (*Emberiza cia*)**

~ Phénotype ancestral ~

Taille du corps : 15.5 – 16cm. assez long, bien proportionné. Poitrine bien arrondie

Zones du plumage	Couleur
Tête	Fine, elliptique. Nuque peu marquée, fine, elliptique. Nuque peu marquée, grise marquée de deux traits longitudinaux noirs. Sourcil : blanc, délimité par un trait oculaire noir, qui s'arrondit derrière la joue et rejoint le trait moustachal partant de la commissure du bec. Joues : grises..
Cou, nuque	Menton : blanc. Nuque et gorge : grises
Dos	Brun-roussâtre, strié de noir.
Poitrine, gorge	Grise, puis brun-roux s'éclaircissant graduellement sur le ventre
Flancs	Brun-roux, légèrement striés de noir.
Ventre, région anale	Beige clair, devenant blanchâtre sur la zone anale
Ailes	Rémiges primaires : brun-noirâtre Rémiges secondaires : liserées de brun sur le vexille externe. Grandes couvertures : noires, liserées de blanc. Couvertures primaires : brun-noir, avec liseré beige à leur extrémité. L'ensemble formant deux barres alaires
Croupion	Brun-roux uni
Queue	Rectrices : brun-noirâtre, liserées de brun à l'extrémité. Les deux rectrices externes sont blanches.
Bec	Gris-noirâtre
Yeux	Noirs
Pattes, doigts	Gris-brun, assez longues et fines.

Ongles	Gris noir
--------	-----------

**Remarques : femelle : au mâle en plus sombre. Teinte générale brun roussâtre, largement striée de noir.**

# Bruant mélanocéphale (*Emberiza melanocephala*)

## ~ Phénotype ancestral ~

Taille du corps : 16.5 – 17cm. Oiseau svelte, de silhouette élégante et de couleurs bien tranchées.

Zones du plumage	Couleur
Tête	Calotte crânienne : de la base du bec jusqu'à la nuque et les joues entièrement noir uni, nettement délimité du jaune-citron du menton et de la gorge.
Cou, nuque	Nuque : jaune, voilé de brun. Le voile brun déborde légèrement sur la poitrine à hauteur de l'épaule.
Dos	Brun-roux uni.
Poitrine, gorge	Jaune-citron, lumineux et uniforme
Flancs	Jaune-citron, lumineux et uniforme
Ventre, région anale	Jaune-citron, lumineux et uniforme
Ailes	Scapulaires, couvertures et rémiges secondaires : gris-noirâtre, largement liserés de gris-beige clair sur tout leur pourtour. Grandes rémiges : noirâtres, portant une fine marge claire sur le vexille externe
Croupion	Marron, lavé de jaunâtre.
Queue	Assez longue. Légèrement échancrée. Rectrices : noirâtres, légèrement plus claires sur leur pourtour sur la face externe. La face interne est gris foncé, lavé de jaunâtre
Bec	Brun-noirâtre
Yeux	noirs
Pattes, doigts	Gris beige
Ongles	Gris noir

**Remarques : femelle : De teinte générale gris-beige clair. La tête et le dos sont marqués de stries fines et irrégulières. Croupion brun. Sourcil clair, assez marqué qui tranche sur le dessin des joues. Gorge crème-jaunâtre, assez lumineux. Légère suffusion brune à hauteur de l'épaule. Face ventrale, gris-beige clair uni. Région anale jaunâtre. Le dessin d'aile est identique à celui du mâle, mais de couleur plus terne**

## Bruant ortolan (*Emberiza hortulanus*)

~ Phénotype ancestral ~

Taille du corps : 15.5 – 16cm. Forme très élégante, assez ronde.

Zones du plumage	Couleur
Tête	Fine, élégante en gris-vert olive Zone lorale et cercle orbital : jaune, formant une lunette bien visible. Moustache : jaune, délimitée de vert-olive
Cou, nuque	Bavette : jaune, s'étalant sur le menton et le haut de la gorge.
Dos	Brun, strié de noir.
Poitrine, gorge	Plastron : vert-olive, s'étalant sur le bas de la gorge et le haut de la poitrine Vert-olive, puis brun-roux
Flancs	Brun-roux uni.
Ventre, région anale	Brun-roux, s'éclaircissant en brun-jaunâtre sur la zone anale
Ailes	Rémiges : brun-noirâtre, liserées de brun-roux. Couvertures : noirâtres, bordées de gris-blanchâtre, forment deux barres alaires indistinctes
Croupion	Brun, légèrement strié.
Queue	Rectrices : brun-noirâtre, avec liseré brun. De chaque côté, les deux rectrices externes portant une tache blanche, occupant environ la moitié de l'extrémité inférieure.
Bec	Rose, légèrement grisâtre à la pointe
Yeux	noirs
Pattes, doigts	Couleur chair. assez longues
Ongles	Gris-brun.

**Remarques : La femelle présente une livrée approchant celle du mâle avec des contours plus ternes et des stries plus marquées. Le vert-olive de la tête est remplacé par une teinte gris-brun strié. Toute la poitrine est roussâtre, striée de brun. La gorge est jaunâtre, finement striée de brun.**



Standard K.B.O.F.

# Bruant zizi (*Emberiza cirrus*)

## ~ Phénotype ancestral ~

Taille du corps : 16cm. Bien proportionné, à la fois élégant et puissant.

Zones du plumage	Couleur
Tête	Elégante, bien proportionnée. Nuque peu marquée. Dessin du crâne : gris-olive Sourcils : jaune Trait loreal : noirâtre, s'arrondissant derrière la joue et rejoignant le dessin de la gorge. Joues : jaune.
Cou, nuque	Menton et partie supérieure de la gorge : noirs, délimités par un demi collier jaune..
Dos	Brun-roux, avec des stries noires bordées de franges plus claires.
Poitrine, gorge	Plastron vert-olive uni. En hiver : la gorge est frangée de schimmel gris
Flancs	Haut des flancs brun-roux, s'éclaircissant en brun légèrement strié de brun foncé
Ventre, région anale	Jaune terne.
Ailes	Rémiges primaires : noirâtres. Rémiges secondaires et couvertures primaires : noirâtres, largement striées de brun-roux. Grandes couvertures : noires bordées de blanc-jaunâtre
Croupion	Brun-vert olive clair, légèrement strié
Queue	Rectrices brun-noirâtre, plus clair sur le vexille externe. Rectrices médianes : blanches
Bec	Brun-noirâtre
Yeux	Noirs
Pattes, doigts	Gris-beige.
Ongles	Grisâtre

**Remarques : La femelle : Teinte générale gris-beige. La tête, le dos, la poitrine et les flancs sont striés de brun-noir. Tour des joues et moustaches gris-brun. Une légère suffusion**

*jaune apparait sur la gorge et la face ventrale. Croupion  
brun-olive*



**Standard K.B.O.F.**

# Bruant à tête rousse (*Emberiza bruniceps*) mâle

~ Phénotype ancestral ~

Taille du corps :

Zones du plumage	Couleur
Tête	Brun noisette, depuis la base du bec jusqu'à la nuque, en passant par les joues, la gorge et le haut de la poitrine
Cou, nuque	Jaune vert.
Dos	Jaune vert, strié de brun foncé
Poitrine, gorge	Délimitation nette entre le haut de la poitrine qui est brun noisette et la partie inférieure qui est jaune Gorge, brun noisette très intense en forme de bavette.
Flancs	Jaune
Ventre, région anale	Jaune
Ailes	Noir brun. Les rémiges présentent un liseré blanc sale
Croupion	Jaune
Queue	Noir brun avec un liseré brun. Sous caudales jaunes.
Bec	Noir brun variant jusqu'à la couleur corne
Yeux	Noir brun.
Pattes, doigts	Brun clair.
Ongles	Couleur chair.

[Remarques :](#)

## Bruant à tête rousse *femelle (Emberiza bruniceps)*

~ Phénotype ancestral ~

Taille du corps :

Zones du plumage	Couleur
Tête	Gris brun
Cou, nuque	Gris brun
Dos	Gris brun
Poitrine, gorge	Gris brun
Flancs	Gris brun
Ventre, région anale	Gris brun
Ailes	Gris brun, les liserées des plumes sont légèrement plus claires
Croupion	Gris brun
Queue	Gris brun, les liserées des plumes sont légèrement plus claires
Bec	De couleur corne
Yeux	Noir brun
Pattes, doigts	Brun clair.
Ongles	De couleur corne.

Remarques :



# Bruant des roseaux mâle (*Emberiza schoeniclus*)

~ Phénotype ancestral ~

Taille du corps : 15.5cm.

Zones du plumage	Couleur
Tête	<p>En été : front, vertex, occiput, côtés de la tête, menton, gorge et centre de la poitrine de couleur noire</p> <p>En hiver : les mêmes parties sont brunâtres.</p> <p>Un dessin de fer à cheval beige sur la région auriculaire. Ce dessin part de la base du bec et rejoint l'arrière de l'œil</p> <p>Moustaches : blanches et collier blanchâtre entourant la nuque chez les mâles adultes.</p> <p>Double moustaches blanche et brune foncée sans collier blanchâtre chez les jeunes mâles.</p>
Cou, nuque	Noire en été brunâtre en hiver
Dos	Noir brunâtre avec des larges stries rousses
Poitrine, gorge	Le haut de la poitrine est noir brunâtre avec des stries foncées.
Flancs	Couleur de fond blanchâtre avec des stries de couleur brun noirâtre.
Ventre, région anale	Blanchâtre, sous caudale grisâtre.
Ailes	<p>Rémiges primaires : brun noirâtre, liserées de roux le long du vexille externe.</p> <p>Rémiges secondaires : terminées par une extrémité plus claire.</p> <p>Deux bandes alaires roussâtres mais claires</p>
Croupion	Brun grisâtre non strié
Queue	Rectrices de couleur noir brunâtre avec un bord étroit brun jaunâtre le long du vexille externe, excepté les deux rectrices médianes qui sont brunes. Les deux paires de rectrices externes sont marquées de taches blanches en forme de demi-lune.
Bec	Noir à noir brunâtre, flammé de noir à la partie supérieure
Yeux	Brun foncé.
Pattes, doigts	De couleur brunâtre
Ongles	De couleur noire

## Remarques :

# Bruant des roseaux femelle (*Emberiza schoeniclus*)

~ Phénotype ancestral ~

Taille du corps : 15.5cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	Vertex : brun roux, strié de noir Large sourcil beige. Menton et gorge plus blanchâtre Double moustache blanche et noire.
Cou, nuque	Noire en été brunâtre en hiver
Dos	Noir brunâtre avec des larges stries rousses
Poitrine, gorge	Le haut de la poitrine est noir brunâtre avec des stries foncées.
Flancs	Striés de larges raies noires.
Ventre, région anale	Plus beige que chez le mâle et strié de brun noir.
Ailes	Rémiges primaires : brun noirâtre, liserées de roux le long du vexille externe. Rémiges secondaires : terminées par une extrémité plus claire. Deux bandes alaires roussâtres mais claires
Croupion	D'une couleur brune plus foncée
Queue	Rectrices de couleur noir brunâtre avec un bord étroit brun jaunâtre le long du vexille externe, excepté les deux rectrices médianes qui sont brunes. Les deux paires de rectrices externes sont marquées de taches blanches en forme de demi-lune.
Bec	Noir à noir brunâtre, flammé de noir à la partie supérieure
Yeux	Brun foncé
Pattes, doigts	brunâtre
Ongles	noirs

Remarques :

# Bruant jaune (*Emberiza citrinella*)

~ Phénotype ancestral ~

Taille du corps : 16cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	Jaune citron avec un dessin en forme de V de couleur brunâtre sur le haut de la tête et se prolongeant vers la nuque Région de la joue comportant un dessin en forme de fer à cheval brunâtre. Des moustaches de couleur brunâtre des deux côtés de la gorge et du cou
Cou, nuque	Nuque : verdâtre.
Dos	Le manteau et les scapulaires sont de couleur brun verdâtre avec des stries brun noir.
Poitrine, gorge	Haut de la poitrine : brun avec un reflet verdâtre Le milieu et les côtés ont un léger dessin strié de brun. Gorge de couleur jaune citron.
Flancs	Légèrement striés de roux.
Ventre, région anale	Jaune citron.
Ailes	Rémiges : brun noirâtre avec un étroit liseré jaune clair le long du vexille externe. Légère bande alaire formée par les couvertures moyennes liserées de jaune clair (ET PAS DE BLANC).
Croupion	Roux
Queue	Rectrices brun noirâtre avec les deux rectrices externes marquées d'une tache blanche sur l'extrémité inférieure des plumes. Les rectrices ont un étroit bord jaunâtre le long du vexille externe.
Bec	Grisâtre
Yeux	Brun foncé.
Pattes, doigts	De couleur chair.
Ongles	Brun

***Remarques : La femelle ressemble au mâle mais la couleur est plus pâle dans l'ensemble. Le jaune du mâle est remplacé***

*par une couleur brun verdâtre. La tête, le dos, la poitrine et les flancs sont plus striés que chez le mâle. la femelle ne possède pas le dessin typique en V sur la tête.*





## Bruant proyer (*Emberiza calandra*)

~ Phénotype ancestral ~

Taille du corps : 17.5cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	De couleur brun grisâtre, légers sourcils beiges, striée de gris foncé.
Cou, nuque	Brun grisâtre, striés de gris foncé
Dos	Brun, strié de gris brun foncé
Poitrine, gorge	Beige, striée de gris foncé. Dessin beige à la base des joues (en forme de demi-lune). Gorge : beige avec deux traits de barbe gris foncé
Flancs	De couleur beige et striés de gris foncé.
Ventre, région anale	Beige striés de gris foncé
Ailes	Brunes foncées avec un léger liseré beige le long du vexille externe et se prolongeant jusqu'à l'extrémité des rémiges primaires Barre alaire visible sur les couvertures moyennes.
Croupion	Brun et moins strié que le dos
Queue	Rectrices de couleur brun foncé avec liseré beige le long du vexille externe
Bec	Gros, jaunâtre avec l'extrémité grise
Yeux	Brun foncé.
Pattes, doigts	Jaunâtre
Ongles	brun

**Remarques : la femelle est légèrement plus petite que le mâle.**





Standard K.B.O.F.

